

施設長 各位

那覇市医師会

会 長 友利博朗

理 事 宮城政剛



「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第8.0版」の周知について

平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。

沖縄県医師会を通じて「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第8.0版」の周知について」の通知が届きましたのでご案内申し上げます。つきましては、別添資料を当会ホームページに掲載致しますので、お手数ですがダウンロードをお願いします。また、インターネットに対応していないなど紙ベース（印刷物）での提供をご希望の際は、お手数ですが、下記に施設名を記入しFAXにて那覇市医師会・事務局までお申し込みいただきますようご案内申し上げます。

☆ 問合せ先（那覇市医師会 事務局：石垣・前泊 /電話 098-868-7579）

.....記.....

沖医発第 638 号
令和4年8月1日

地区医師会担当理事 殿

沖縄県医師会
副会長 宮里達也

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第8.0版」の周知について

今般、日本医師会から標記文書の発出がありましたのでご連絡致します。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版」につきましては、令和4年5月24日付(沖医発第246号)にてご連絡申し上げました。

本件は、今般、同手引きに新たな知見が加えられ、第8.0版として更新された旨の通知となっております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、貴管下関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第8.0版」の周知について
(令和4年7月26日 (日医発第778号(健II)))

※関係文書は文書管理システムへ掲載致します。

沖縄県医師会事務局業務2課：平良、高良
TEL：098-888-0087 FAX：098-888-0089
g2@okinawa.med.or.jp

- ★ 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第8.0版」の周知について (77頁)
を紙ベースで送付希望の施設は、施設名をご記入の上 FAX(098-867-3750)をお願い致します。

施設名 :

FAX送付先 : 098-867-3750

日医発第 778 号（健Ⅱ）
令和 4 年 7 月 26 日

都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
釜 范 敏

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 8.0 版」の周知について

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 7.2 版」につきましては、令和 4 年 5 月 10 日付日医発 340 号（健Ⅱ）をもってご連絡申し上げました。

今般、同手引きについて、新たな知見を踏まえて、第 8.0 版として更新した旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛て別添の事務連絡がなされましたのでご連絡いたします。主な改訂部分は下記のとおりです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

記

（参考 2 「新型コロナウイルス感染症診療の手引き第 8.0 版（ダイジェスト）」より）

1 病原体・疫学

- 病原体・国内発生状況・海外発生状況を更新

2 臨床像

- 臨床像を更新（特にオミクロン株の知見・インフルエンザとの鑑別を更新）
- 重症化リスク因子・胸部画像所見・合併症・妊婦例の特徴を更新
- 小児の重症度・小児における家庭内感染率について更新・小児における死亡例を追加

3 症例定義・診断・届出

- 症例定義・届出を更新

4 重症度分類とマネジメント

- 序文・重症度分類・軽症・中等症・重症・ECMO・血液浄化療法・血栓症対策・凶を更新
- 高齢者における療養のあり方を追加
- 医療提供体制と自宅療養について を参考から追加

5 薬物療法

- モルヌピラビル・ソトロビマブ・カシリビマブ／イムデビマブ・禁忌
・日本国内で開発中の薬剤を更新

6 院内感染対策

- 序文・患者寝具類の洗濯・職員の健康管理・妊婦および新生児への対応を更新
・基本情報の表を追加

7 退院基準・解除基準

- 退院基準を更新

事務連絡
令和4年7月22日

各 { 都道府県
保健所設置市
特別区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第8.0版」の周知について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引きは、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第7.2版」の周知について」（令和4年5月9日付け事務連絡）において通知しておりましたが、本日、新たな知見を踏まえ、別添のとおり当該手引きが第8.0版として更新されましたので、内容について御了知の上、関係各所への周知の程お願いいたします。

記

（参考1）

- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第8.0版

（参考2）

- 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き・第8.0版 改訂のポイント

以上

新型コロナウイルス感染症 COVID-19

診療の手引き **第8.0版**

July 2022

*本手引き（第 8.0 版）は、2022 年 7 月 21 日までの情報を基に作成しました。今後の知見に応じて、内容に修正が必要となる場合があります。厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページから常に最新の情報を得るようにしてください。

【診療の手引き検討委員会（五十音順）】

足立拓也（東京都立豊島病院 感染症内科）
鮎沢 衛（神奈川工科大学健康医療科学部）
氏家無限（国立国際医療研究センター 国際感染症センター）
大曲貴夫（国立国際医療研究センター 国際感染症センター）
織田 順（大阪大学大学院医学系研究科 救急医学）
加藤康幸（国際医療福祉大学成田病院 感染症科）
神谷 元（国立感染症研究所 感染症疫学センター）
川名明彦（防衛医科大学校 感染症・呼吸器内科）
忽那賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学）
小谷 透（昭和大学医学部 集中治療医学）
鈴木忠樹（国立感染症研究所 感染病理部）
多屋馨子（神奈川県衛生研究所）
徳田浩一（東北大学病院 感染管理室）
橋本 修（日本大学）
馳 亮太（成田赤十字病院 感染症科）
早川 智（日本大学医学部 微生物学）
藤田次郎（おもと会大浜第一病院／琉球大学）
藤野裕士（大阪大学大学院医学系研究科 麻酔集中治療医学）
迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学）
森村尚登（帝京大学医学部 救急医学）
倭 正也（りんくう総合医療センター 感染症センター）
横山彰仁（高知大学医学部 呼吸器・アレルギー内科学）
〔編集・執筆協力者〕
斎藤浩輝（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター）
船木孝則（国立成育医療研究センター 感染症科）
日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
勝田友博（聖マリアンナ医科大学）／菅 秀（国立病院機構三重病院）／津川 毅（札幌医科大学）
〔編集協力〕 studio0510

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 8.0 版 2022/7/22

第 1.0 版発行 2020/ 3/17
第 2.0 版発行 2020/ 5/18（第 2.1 版 6/17，第 2.2 版 7/17）
第 3.0 版発行 2020/ 9/ 4
第 4.0 版発行 2020/12/ 4（第 4.1 版 12/25，第 4.2 版 2021/2/19）
第 5.0 版発行 2021/5/ 26（第 5.1 版 6/30，第 5.2 版 7/30，第 5.3 版 8/31）
第 6.0 版発行 2021/11/ 2（第 6.1 版 12/28，第 6.2 版 2022/1/27）
第 7.0 版発行 2022/2/ 28（第 7.1 版 3/31，第 7.2 版 2022/5/9）

CONTENTS

はじめに 4

1 病原体・疫学 5

病原体／伝播様式／国内発生状況／海外発生状況

2 臨床像 10

臨床像／重症化のリスク因子／胸部画像所見／合併症／小児例の特徴／妊婦例の特徴／罹患後症状

3 症例定義・診断・届出 26

症例定義／病原体診断／血清診断／届出

4 重症度分類とマネジメント 32

重症度分類／高齢者における療養のあり方について／軽症／中等症／重症／妊産婦の管理
参考：新たなレベル分類と医療逼迫時の対応

5 薬物療法 47

抗ウイルス薬／中和抗体薬／免疫抑制・調節薬／妊婦に対する薬物療法

6 院内感染対策 60

個人防護具／環境整備／廃棄物／患者寝具類の洗濯／食器の取り扱い／死後のケア／
職員の健康管理／妊婦および新生児への対応／ネーザルハイフロー使用時の感染対策

7 退院基準・解除基準 69

退院基準／宿泊療養等の解除基準／生活指導

第8版 はじめに

前版の公表以来、オミクロン株による大規模な感染拡大は落ち着きつつありましたが、2022年7月に入り再び患者数が増加に転じています。ワクチンの普及やオミクロン株の特性などにより成人の重症化率は低下する一方、高齢者への医療や院内感染対策などの課題がより鮮明になりました。現在の流行に関する知見や提言、国からの情報などを反映させ、第8.0版を作成しました。より多くの医療機関が連携して対応することが求められるなか、本手引きが関係者に参考にされ、患者の診療ケアの一助となることを期待します。

第7版 はじめに

(2022年2月28日発行)

2021年末頃から世界の多くの地域でオミクロン株によるこれまで最大規模の流行が経験されています。日本国内でも医療機関への負荷は大きくなっていますが、ワクチンの追加接種や新規薬剤の導入など進展も見られます。今回、新しい知見、最近の行政対応の変化などを反映させた第7.0版を作成しました。2年を越えるCOVID-19の流行に日夜奮闘されている関係者に改めて敬意を表するとともに、本手引きが引き続き患者の診療ケアの一助となることを期待します。

第6版 はじめに

(2021年11月2日発行)

2021年7月から9月にかけて、首都圏などを中心にデルタ株による大きな流行が経験されました。確立されてきた薬物療法の効果が実感されるようになった一方、医療逼迫とそれに伴う自宅療養者の増加は基本的なケアの重要性をあらためて指摘しているように思います。公衆衛生対策と患者に対する医療を同時に推進していくためには、関係者の連携が一層重要になると考えられます。この第6版では、新しい知見を反映させるとともに、文献などを含めて情報を整理しました。医療現場で参考にされ、患者の診療ケアの一助となることを期待します。

第5版 はじめに

(2021年5月26日発行)

2021年初頭をピークに、日本を含む北半球の多くの地域はCOVID-19の大きな流行を経験しました。懸念される変異株の出現に代表されるように、パンデミックの状況は変化し続けています。日本国内でも予防接種が始まりましたが、感染症対策における患者に対する医療の重要性は変わりません。逼迫する医療環境の中で、確立されてきた治療をできるだけ多くの患者に届けるためには、関係者の一層の連携が重要と考えられます。第4版以降の新しい知見や情報を反映させ、第5版を作成しました。医療現場で参考にされ、患者の診療ケアの一助となることを期待します。

1版 はじめに

(2020年3月17日発行)

2019年12月、中華人民共和国の湖北省武漢市で肺炎患者の集団発生が報告されました。武漢市の封鎖などの強力な対策に関わらず、この新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染は世界に拡大し、世界保健機関は公衆衛生上の緊急事態を2020年1月30日に宣言しました。日本国内では、1月16日に初めて患者が報告され、2月1日に指定感染症に指定されました。また、今後の患者の増加に備えて、水際対策から感染拡大防止策に重点を置いた政府の基本方針が2月25日に示されました。

日本国内では3月4日現在で患者257例(国内事例246例、チャーター便帰国者事例11例)の報告があります。横浜港に停泊中のクルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス号)から患者を受け入れた首都圏などの医療機関では患者の診療を経験する一方、まだ患者が発生していない地域もあるのが現状です。医療従事者においても、この新興感染症にどのように対処すべきか、不安を抱えているのが現状ではないでしょうか。

医療機関には新興感染症が発生した際、患者に最善の医療を提供するという役割があります。職業感染を防止しながらこの役割を担うには、事前の準備がきわめて重要です。幸い、中国の医師や研究者らにより患者の臨床像などの知見が迅速に共有されてきました。日本国内からも症例報告がなされるようになってきました。同時に政府からの通知や学会などからの指針も多数発出され、情報過多の傾向もあるように見受けられます。

本診療の手引きは現時点での情報をできるだけわかりやすくまとめたものです。医療従事者や行政関係者に参考にされ、患者の予後改善と流行制圧への一助となることを期待します。

研究代表者 加藤 康幸


令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究

病原体・疫学

1. 病原体

これまでにヒトコロナウイルスは4種が同定されており、感冒の原因の10～15%を占める病原体として知られる。また、イヌやネコ、ブタなど動物に感染するコロナウイルスも存在する。2002年中国・広東省に端を発した重症急性呼吸器症候群（SARS）は、コウモリのコロナウイルスがハクビシンを介してヒトに感染、主に医療施設内でヒト-ヒト感染を起こし、世界で8,000人を超える患者が報告された。また、2012年にはアラビア半島で中東呼吸器症候群（MERS）が報告され、ヒトコブラクダからヒトに感染することが判明している。2019年12月に中国・湖北省武漢市で発生した原因不明の肺炎は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が原因であることが判明した（図1-1）。SARSやMERSの病原体と同じβコロナウイルスに分類される動物由来コロナウイルスであるが、宿主動物は分かっていない。その後、ヒト-ヒト感染によって流行が世界的に広がっている状況である。SARS-CoV-2による感染症をCOVID-19（感染症法では新型コロナウイルス感染症）と呼ぶ。

図1-1 病原体 SARS-CoV-2 動物由来コロナウイルス



エンベロープにある突起が王冠（ギリシア語でコロナ）のように見える。SARSの病原体（SARS-CoV-1）と同様にアンジオテンシン変換酵素2（ACE2）をレセプターとしてヒトの細胞に侵入する。3日間程度は環境表面で安定と考えられる。

2022年6月現在、国立感染症研究所は、世界保健機関（WHO）等の評価を参考に、国内における感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念されるSARS-CoV-2の変異株 Variants of Concern（VOC）として、B.1.1.529系統（オミクロン株）を分類している。

2022年6月現在、世界で検出される株のほぼすべてがオミクロン株と考えられている。オミクロン株の中では、BA.2系統、BA.2.12.1系統、それ以外のBA.2系統の亜系統、BA.4系統、BA.5系統がそれぞれ36%、17%、12%、9%、25%を占めた。WHOはオミクロン株のうち、いくつかの亜系統（BA.4、BA.5、BA.2.12.1、BA.2.9.1、BA.2.11、BA.2.13）をVOCにおける監視下の系統（VOC-LUM）としている。

加えてワクチンの効果や感染力に影響を与える可能性がある注目すべき変異株 Variants of Interest（VOI）があるが、現在は該当する系統はない。また、監視下の変異株 Variants under Monitoring（VUM）から、B.1.351系統（ベータ株）、P.1系統（ガンマ株）が除外され、B.1.1.7系統（アルファ株）、B.1.617.2系統（デルタ株）のみとなっている。

2. 伝播様式

【感染経路】 感染者（無症状病原体保有者を含む）から咳、くしゃみ、会話などの際に排出されるウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル（飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子）の吸入が主要感染経路と考えられる。

SARS-CoV-2 の環境下での生存期間は、プラスチック表面で最大 72 時間、ボール紙で最大 24 時間とされている（WHO）。

【エアロゾル感染】 エアロゾル感染は厳密な定義がない状況にある。SARS-CoV-2 感染者から近い距離でのエアロゾル曝露による感染を示唆する報告がある。一般的に 1m 以内の近接した環境で感染するが、エアロゾルは空気中にとどまり得ることから、密閉空間などにおいては 1m を超えて感染が拡大するリスクがある。医療機関では、少なくともエアロゾルを発生する処置が行われる場合には、空気予防策が推奨される。

【潜伏期・感染可能期間】 潜伏期は 1～14 日間であり、曝露から 5 日程度で発症することが多い。ただし、オミクロン株は潜伏期が 2～3 日、曝露から 7 日以内に発症する者が大部分であるとの報告がある*。発症前から感染性があり、発症から間もない時期の感染性が高いことが市中感染の原因となっており、SARS や MERS と異なる特徴である。

* 国立感染症研究所。SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統（オミクロン株）の潜伏期間の推定：暫定報告。2022.1.14。

SARS-CoV-2 は上気道と下気道で増殖できると考えられ、重症例ではウイルス量が多く、排泄期間も長い傾向にある。発症から 3～4 週間、病原体遺伝子が検出されることは稀でないが、感染性があることと同義ではない。感染可能期間は発症 2 日前から発症後 7～10 日間程度と考えられている。なお、血液、尿、便から感染性のある SARS-CoV-2 が検出されることは稀である。

【季節性】 コロナウイルス感染症は一般に温帯では冬季に流行するが、COVID-19 については、現時点では気候などの影響は明らかでない。

3. 国内発生状況

日本では 2020 年 1 月 6 日に疑似症サーベイランスの枠組みで患者を探知する体制が取られ、1 月 15 日に武漢市に滞在歴がある肺炎の患者が国内初症例として神奈川県で報告された。2 月 1 日の指定感染症への指定以前に 12 例が報告され、うち 3 例に海外渡航歴を認めなかった。1 月末から 2 月は武漢からのチャーター便とクルーズ船（ダイヤモンド・プリンセス号）から感染者が報告された。3 月には欧州などでの感染が疑われる患者が増加し、4 月上旬をピークに流行が認められた（年齢中央値：49 歳）。これに伴い、4 月 16 日には全都道府県に緊急事態宣言が発出された。次いで 6 月中旬から大都市を中心に 20～30 代の患者が増加し、8 月上旬をピークとした流行が発生した。以後、2021 年 1 月上旬、5 月上旬（アルファ株中心）、8 月下旬（デルタ株中心）、2022 年 2 月上旬（オミクロン株中心）をそれぞれピークとする流行が発生した。

現在のオミクロン株の流行は過去最多の患者数を記録しているが、人工呼吸を要するような重症者数は比較的少ない（図 1-2, 1-3）。一方、80 歳以上の高齢者を中心に死亡者は過去最多である（図 1-4）。

2022 年 7 月 21 日現在、日本で検出されるオミクロン株は B.1.1.529 系統の下位系統である BA.2 系統から、BA.5 系統が主流となり、置き換わったと推定されている。

〈参考〉第 91 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料 2022.7.21。

図 1-2 COVID-19 新規陽性者数の推移（日別）（2022年07月08日現在）




図 1-3 COVID-19 重症者数の推移（日別）（2022年07月08日現在）




図 1-4 COVID-19 死亡者数の推移（日別）（2022年07月08日現在）




図 1-5 性別・年代別陽性者数（累積）

(2022年07月05日)




図 1-6 性別・年代別死亡者数（累積）

(2022年07月05日)





図 1-7 新規感染者数（1週間移動合計）の推移【圏域ごと】(対人口10万人) 2021/4/1~2022/6/29



4. 海外発生状況

【海外発生動向（2022年6月26日現在）】

2019年12月に中国・武漢市で原因不明の肺炎症例が報告されて以降、2020年1月30日にWHOはCOVID-19に対して「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を宣言（現在も継続中）、3月11日には「パンデミック（世界的な流行）とみなせる」と表明した。

COVID-19の症例は、すべての大陸で報告され、流行開始から約1年が経過した2020年1月の累積感染者数は1億人を超えた。2022年6月26日時点の報告では、累積感染者数は約5億4,100万人、累積死者は約630万人となっている。地域的な分布について、累積感染者数では、ヨーロッパ地域が42%、アメリカ地域が30%、西太平洋地域が12%、東南アジア地域が11%を占め、この4地域で世界の95%を占める。

この間、COVID-19の新規感染者数は増加と減少を繰り返し、変異株も大きく影響を与えている。世界で流行株の半数を占めたものに、アルファ株（半数を占めた時期：2021年3月）、デルタ株（同：2021年6月）、オミクロン株（同：2022年1月）がある。

世界的に、流行株はオミクロン株にほぼ置換され、2021年12月～2022年1月にかけて新規感染者数の大きく急速な増加が報告された。一部の地域では3月に再度増加がみられたが、全体として減少傾向が継続している。2022年6月20日～26日において、東地中海、ヨーロッパ、東南アジア、アメリカ地域で患者が増加したが、アフリカや西太平洋地域では減少した。

〈参考〉

- ・ WHO. Listings of WHO's response to COVID-19. 2021.
- ・ WHO. Statement on the eleventh meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. 13 April 2022.
- ・ WHO. Weekly epidemiological update on COVID-19. 29 Jun 2022.

◆引用・参考文献◆

- ・ 土橋西紀, 他. 日本と世界における新型コロナウイルス感染症の流行. 日内会誌 2020.
- ・ 秋田県健康環境センター, 他. ヒトコロナウイルス (HCoV) 感染症の季節性について—病原微生物検出情報 (2015～2019年) 報告例から—. IASR 2021.
- ・ 国立感染症研究所. 新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報 2022.6.28 の状況. IDWR 2022.
- ・ 国立感染症研究所. 発症からの感染可能期間と再陽性症例における感染性・二次感染リスクに関するエビデンスのまとめ (2021.2.18).
- ・ 国立感染症研究所. 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) の変異株について (第18報) 2022.7.1.
- ・ 国立感染症研究所. SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統 (オミクロン株) について (第9報) 2022.3.16.
- ・ Hu B, et al Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol 2021.
- ・ US CDC. Scientific brief: SARS-CoV-2 transmission. May 2021.
- ・ US CDC. Science brief: Omicron (B.1.1.529) variant. 2 Dec 2021.
- ・ US CDC. Science brief: SARS-CoV-2 and surface (fomite) transmission for indoor. Apr 2021.
- ・ van Doremalen N, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020.
- ・ Wan CC, et al. Airborne transmission of respiratory viruses. Science 2021.
- ・ WHO. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions, Scientific brief, 9 July 2020.
- ・ Wölfel R, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 2020.
- ・ Zhou P, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 2020.

2

臨床像

1. 臨床像

SARS-CoV-2 に曝露されてから発症するまでの潜伏期は約 5 日間、最長 14 日間とされてきたが、オミクロン株では短縮される傾向にあり、中央値が 2.9 日、患者の 99 % が曝露後 10 日までに発症するとされる。感染後無症状のまま経過する者の割合は、複数のメタアナリシスによると 20 ~ 40 % と考えられる。濃厚接触者などでは PCR 検査の陽性判明後に発症する場合もあることに注意する。

日本国内で 2020 年 1 月 25 日~2021 年 5 月 6 日までに入院した 770 例の患者（男性 57 %、年齢中央値 51.0 歳、基礎疾患あり 35 %）の積極的疫学調査によると、発症時の症状は発熱（52 %）、呼吸器症状（29 %）、倦怠感（14 %）、頭痛（8 %）、消化器症状（6 %）、鼻汁（4 %）、味覚異常（3 %）、嗅覚異常（3 %）、関節痛（3 %）、筋肉痛（1 %）の順に多くみられた。インフルエンザや普通感冒と比較して、鼻汁・鼻閉は少なく、嗅覚・味覚障害の多いことが COVID-19 の特徴と考えられてきたが、オミクロン株による感染では、ウイルスが上気道で増殖しやすい特性に伴い、鼻汁・鼻閉、咽頭痛などの感冒様症状の頻度が増加した。また、嗅覚・味覚障害の症状の頻度が減少したと報告されている。


SARS-CoV-2 はまず鼻咽頭などの上気道に感染すると考えられる。多くの患者は発症から 1 週間程度で治癒に向かうが、一部の患者では感染は下気道まで進展すると考えられる。さらに、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）に至る患者もある。日本における COVID-19 入院患者レジストリ（COVIREGI-JP）によると、流行初期（2020 年 3 月~7 月）に入院した 2,636 例の重症度内訳は、酸素投与なし（62 %）、酸素投与あり（30 %）、人工呼吸器治療（9 %）であった。合併症では、血栓塞栓症が COVID-19 の特徴の一つと考えられ、死因ともなりうる（「4 合併症」参照）。

重症の患者は高齢や肥満などのリスク因子を有することが多い（「2 重症化リスク因子」参照）。小児は一般に軽症であるが、重篤な基礎疾患を認める場合は重症化に注意する必要がある（「5 小児例の特徴」参照）。また、一部の妊婦も重症化しやすいと考えられる（「6 妊婦例の特徴」参照）。

現在のオミクロン株による流行では、アルファ株やデルタ株が主体の流行と比較して、酸素療法や人工呼吸管理を必要とする患者の割合が低下していることが報告されている。英国におけるオミクロン株の流行では、デルタ株と比較して致死率が全体で 67% 低下した。特に 18 歳~69 歳以下（86~87% 低下）と男性（75% 低下）で低下率が大きく、70 歳以上（55% 低下）と女性（56% 低下）で小さかった。日本国内でも死亡者に占める 80 歳以上の割合が高くなっており、基礎疾患の増悪や心不全・誤嚥性肺炎などの発症にも注意が必要と考えられる。

オミクロン株では免疫からの逃避による再感染リスクが高いと報告されている。国内で承認されている mRNA ワクチンは、オミクロン株に対しても、これらの重症化を防ぐ効果が高く維持されていること、3 回目の追加接種により、その効果が増強されることが判明している。

図 2-1 COVID-19 の想定される病態



（参考）WHO. What we know about the COVID-19 immune response. 02 Aug 2020.

【病理像の特徴】

剖検例の検討では、SARS-CoV-2 はⅡ型肺胞上皮細胞に検出され、肺胞上皮細胞へのウイルス感染によるウイルス性肺炎が COVID-19 肺炎の本態と考えられている。重症例では、ARDS を反映した DAD (diffuse alveolar damage:びまん性肺胞傷害) の所見が特徴的である。ウイルス抗原は炎症や DAD の所見に乏しく正常な肺に近い形態を示す領域において多く認められる。肺胞上皮への SARS-CoV-2 の感染が病理形成に先行し、感染後の免疫応答によって上記のような病変が形成されると考えられる。また COVID-19 肺炎では、同一個体の同一肺葉内において、滲出期から線維化期までさまざまな病期の病変が同時に存在することが特徴的である。すなわち、肺内のすべての部位において同時にウイルス感染が生じるのではなく、ウイルス感染が徐々に広がることによって次第に病変が拡大し、最終的に呼吸不全をきたすような広大な病変が形成されることが示唆される。

【インフルエンザとの鑑別】

COVID-19 とインフルエンザを臨床症状のみで鑑別することは困難である。都道府県感染症情報センターなどによる疫学情報も参考にされたい。地域の流行状況によっては、発熱や呼吸器症状を呈する患者を診る場合、インフルエンザと COVID-19 との両方の可能性を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。なお、2020/21 シーズンのインフルエンザの推計受診者数は約 1.4 万人であり、例年と比べ著しく少なかった。2021/22 シーズンも同様であり、2021 年 9 月 6 日～2022 年 1 月 30 日までの累積の推計受診者数は約 0.3 万人であった。

2022 年 6 月 12 日現在、世界的にインフルエンザの患者数は減少しているが、大洋州（オーストラリア、ニュージーランドなど）と南アフリカにおいて、A 型インフルエンザの患者数が増加している。

（参考）WHO. Influenza Update N° 422. 27 June 2022.

2. 重症化のリスク因子


COVID-19 は自然に回復する患者も多いが、特定の属性や基礎疾患があると、医療上の入院、酸素投与、集中治療が必要となるリスク（重症化リスク）が大きくなる。本項ではこれらの重症化リスク因子についてまとめた。一般にリスク因子の数が多いほど重症化リスクは大きくなると考えられている。ワクチン接種を適切に受けることは重症化リスクを低下させる有効な手段である。

【年齢・性別】

高齢は最も重要な重症化リスク因子である。現在のオミクロン株の流行において、成人の全年齢群で重症化リスクは低下していると考えられるが、高齢者ほどリスクが大きい点は変化していない。特に高齢かつ後述する基礎疾患のある患者でリスクが大きい。

図 2-2 ワクチン接種歴のない感染者における年代別重症化率*

*重症化率：人工呼吸器、ECMO、ICUなどで治療を受けた患者および死亡者の感染者に対する割合



- ・本データは感染者が療養または入院期間が終了した際のステータスまたは2022年5月31日時点でのステータスに基づき算出しており、重症化率・致死率を過小評価している可能性がある。
- ・感染者数は感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であり、無症候性病原体保有者を含むすべての感染者を補足できておらず、重症化率・致死率を過大評価している可能性がある。
- ・表記の期間内に発生した新規感染者数とそのうちの重症数と死亡者数を単純に集計したものであり、ワクチン接種から検査までの期間や治療内容等の背景因子が異なることなどから、本データによりワクチン接種による予防効果が明らかになるものではない。

また、複数のメタアナリシスによって、男性は女性に比べて重症化や死亡のリスクが高いことが明らかにされている。オミクロン株の流行において、男女の死亡リスク差は小さくなったとする報告もある。

【基礎疾患】

2022年6月30日現在、日本国内の事務連絡や届出などでは、一般に以下の項目が重症化リスク因子としてあげられている。

表 2-1 主な重症化のリスク因子

--

重症化のリスク因子に関しては研究結果が集積されつつあり、以下にあげる基礎疾患などが米国 CDC より報告されている。これらは今後の研究結果に応じて変更されることがある。
また、臨床像の異なるオミクロン株の流行においても適応できるか注意が必要である。

表 2-2 重症化に関連する基礎疾患など（米国 CDC まとめ）

エビデンスレベル	高	中	低
悪性腫瘍			
代謝			
心血管			
肺			
肝臓			
腎臓			
精神神経			
妊娠			
喫煙			
小児			
遺伝			
免疫			

・ US CDC. Science brief: Evidence used to update the list of underlying medical conditions associated with higher risk for severe COVID-19. 15 June 2022.

COVIREGI-JP/REBIND の解析では、流行初期における入院時の重症度に関わるリスク因子、入院後の死亡率が高い基礎疾患は表 2-2 の通りである。入院時に非重症であった者のうち基礎疾患がない場合は、酸素投与や人工呼吸／ECMO 管理を要したのは 11.9 %のみであったが、基礎疾患があると 40 %程度まで増加した。入院時の重症度や死亡のリスク因子はそれぞれ異なることが示唆された。また、オミクロン株症例の検討においても、これらのリスク因子は有意に重症化と相関した。

〈参考〉COVIREGI-JP/REBIND 登録患者におけるオミクロン株症例重症化リスク因子の検討（第 83 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料）

表 2-3 COVIREGI-JP/REBIND における重症化リスク因子

n=3376 ; 16 Jan 2020 - 31 May 2020

・ Terada M, et al. Risk factors for severity on admission and the disease progression during hospitalisation in a large cohort of patients with COVID-19 in Japan. *BMJ Open* 2021.

【ワクチンによる重症化予防効果】

国立感染症研究所において、検査陰性デザインを用いた症例対照研究により、オミクロン株流行期（2022 年 1 月）における新型コロナワクチンの発症予防効果が報告された。2 回接種から 0～2 カ月の有効率（発症予防効果）は 71 %、2 回接種から 2～4 カ月の有効率は 54 %、2 回接種から 4～6 カ月の有効率は 49 %、2 回接種から 6 カ月以降の有効率は 53 %、追加接種後 2 週間程度（中央値 16 日）の有効率は 81 %であった。


また、オミクロン株流行下での米国における検討では、死亡リスクは 2 回接種者で 0.08 %（未接種者 0.3 %）、追加接種者 0.07%と報告されている。再感染やブレイクスルー感染での重症化リスク因子は高齢（65 歳以上）、複数の基礎疾患（特に 4 つ以上）などが報告されている。

〈参考〉

- ・ 国立感染症研究所 . SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統（オミクロン株）について（第 8 報）2022.
- ・ 国立感染症研究所 . 新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究の暫定報告（第 3 報）2022.
- ・ Danza P, et al. SARS-CoV-2 infection and hospitalization among adults aged ≥18 years, by vaccination status, before and during SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) variant predominance — Los Angeles County, California, November 7, 2021–January 8, 2022. *MMWR* 2022.
- ・ Yek C, et al. Risk factors for severe COVID-19 outcomes among persons aged >18 years who completed a primary COVID-19 vaccination series – 465 health care facilities, United States, December 2020–October 2021. *MMWR* 2022.

図 2-3 ワクチン接種歴による年代別重症化率*（2022年1月～2022年2月；暫定値）

*重症化率：人工呼吸器，ECMO，ICUなどで治療を受けた患者および死亡者の感染者に対する割合



- ・本データは感染者が療養または入院期間が終了した際のステータスまたは2022年5月31日時点でのステータスに基づき算出しており，重症化率・致死率を過小評価している可能性がある。
- ・感染者数は感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であり，無症候性病原体保有者を含むすべての感染者を補足できておらず，重症化率・致死率を過大評価している可能性がある。
- ・表記の期間内に発生した新規感染者数とそのうちの重症数と死亡者数を単純に集計したものであり，ワクチン接種から検査までの期間や治療内容等の背景因子が異なることなどから，本データによりワクチン接種による予防効果が明らかになるものではない。

【重症化マーカー】

血液検査は患者の状態把握に参考となるため，重症化リスク因子を有する患者や中等症以上の患者においては実施されることが望ましい。特に患者の重症度判定や予後予測に資するバイオマーカー（重症化マーカー）については，国内外で多数の研究が実施されてきた。これらを補助的に活用することで，診療の質向上や医療資源の有効活用などが期待される。

最近のメタアナリシス（研究数 32；入院患者 10,491 名が対象）によれば，①リンパ球減少，②血小板減少，③Dダイマー上昇，④CRP 上昇，⑤プロカルシトニン上昇，⑥クレアチンキナーゼ上昇，⑦AST 上昇，⑧ALT 上昇，⑨クレアチニン上昇，⑩LDH 上昇，が人工呼吸や死亡と有意に関連していた。

・ Malik P, et al. Biomarkers and outcomes of COVID-19 hospitalisations: systematic review and meta-analysis. BMJ Evid Based Med 2021.

- ・重症例ではインターフェロン産生の低下に関連する遺伝子変異の割合が高いとする報告がある。
- ・IFN-λ3（インターフェロンラムダ3）は，SARS-CoV-2 に感染した患者の血中で，酸素投与を要する中等症Ⅱ以上の症状を示す1～3日前に上昇することが知られており，SARS-CoV-2 陽性の，基本的には入院患者を対象に，測定を実施することで重症化を予測できる可能性がある。ただし，IFN-λ3 陽性の場合には陰性の場合に比べて重症化のリスクが高いが，陰性であっても重症化の可能性を完全に除外することは困難であることに留意すること。

・ Sugiyama M, et al. Serum CCL17 level becomes a predictive marker to distinguish between mild/moderate and severe/critical disease in patients with COVID-19. Gene 2021.

- ・TARC は，SARS-CoV-2 に感染した患者の血中で，酸素投与を要する中等症Ⅱ以上の重症化に至る患者では発症初期から重症化するまでの期間は低値を示すことが知られている。このため，SARS-CoV-2 陽性の患者を対象に1回測定することで，重症化する患者を特定できる可能性がある。ただし，重症化するタイミングを予測することはできないことに留意すること。

【入院患者における予後予測スコア】

COVID-19 の患者数増加に伴い、限られた医療資源を適正に配分するため、重症化する患者を早期に予測するツールの開発が期待されている。すでに入院患者を対象に予後予測スコアがいくつか開発されている（COVID-GRAM, ISARIC WHO 4C Mortality Score など）。日本においても解析などに基づくスコアが発表されている。

表 2-4 予後予測スコアの例（COVIREGI-JP の解析）

年齢群	18-39		40-64		≥ 65	
年齢						
性別						
BMI						
うっ血性心不全						
脳血管疾患						
糖尿病						
高血圧						
悪性疾患						
発熱						
咳						
呼吸困難						
喘鳴						
倦怠感						
酸素療法が必要となるリスクが大きい						

・ Yamada G, et al. Predicting respiratory failure for COVID-19 patients in Japan: a simple clinical score for evaluating the need for hospitalization. Epidemiol Infect 2021.

これらの予後予測スコアは、ワクチン普及以前に開発されたものが多く、臨床像の異なるオミクロン株の流行においても適応できるか注意が必要である。


3. 胸部画像所見

わが国には、独自に開発された胸部高分解能CTがあり、それを活用した画像所見と病理所見が対比されてきた歴史がある。また胸部CTが比較的容易に撮影できることから、胸部画像のパターン解析がなされてきた。以下にCOVID-19症例の画像所見をパターン化して解説する。

COVID-19肺炎の画像所見を特発性間質性肺炎の分類を用いて解析すると、重症のものから、急性間質性肺炎、急性線維素性器質化肺炎、非特異性間質性肺炎、特発性器質化肺炎を示唆する画像所見になる。


胸部CT検査にて明らかな陰影を認めないにも関わらず、低酸素血症を呈する場合があります。肺微小血栓がその病態であると考えられる。このような症例では血痰を伴うことが多い。

図 2-4 20代女性（2020年3月入院：中等症Ⅰ）



米国から帰国後に上気道炎症状が出現、発熱なし。経過観察のみで軽快した。非定型肺炎が最も適切な診断であろう。ウイルス性肺炎といっても矛盾はない。陰影の消退が悪ければ、特発性器質化肺炎も鑑別に上がる。

図 2-5 30代男性（2022年2月入院：中等症Ⅱ→重症）



基礎疾患として肥満（BMI 39）、新型コロナワクチン未接種。

発症2日目に抗原定性検査陽性、発症9日目に自宅から救急要請。入院後、デキサメタゾン、レムデシビル、セフトリアキソン、アジスロマイシンの投与、ネーザルハイフローを開始。翌日、重症対応医療機関に転院。人工呼吸管理となるが短期間で改善し退院。ゲノム解析で検出ウイルスはオミクロン株と確定。

図 2-6 40 代男性（2020 年 4 月入院：重症）



ECMO 管理となったもののステロイド薬が著効した。典型的な photographic negative of pulmonary edema の所見であり、慢性好酸球性肺炎、または特発性器質化肺炎を考える所見である。KL-6 は重症化マーカーとなりうるものの、経過中に KL-6 の上昇を認めなかった。

4. 合併症

COVID-19 では呼吸器以外の器官・臓器にも多彩な病態をきたすことが報告されており、さまざまな臓器で病理組織学的な変化が見られることが報告されている。このような呼吸器以外の臓器の病変部においても SARS-CoV-2 を検出したという研究結果が複数報告されている。一方で相反する報告も複数あり、SARS-CoV-2 が呼吸器以外の臓器に感染するか否かは現時点で確定的ではない。呼吸器以外での病態が SARS-CoV-2 感染による直接的な組織傷害より生じたものであるのか、あるいは感染に対する宿主応答による変化であるのかという点については、今後更なる研究が必要と考えられる。

呼吸不全：急性呼吸窮迫症候群（ARDS）は重症患者の主な合併症であり、呼吸困難の発症直後に現れることがある。

心血管系：急性期の不整脈、急性心障害、ショック、心停止の他、症状回復後の心筋炎などが報告されている。また、COVID-19 の発症から 1 カ月以上経過しても脳血管障害、不整脈、虚血および非虚血性心疾患、心膜炎、心筋炎、心不全などのリスクがあがることが報告されている。

（参考）若年者の男性を中心に、特に 2 回目の mRNA ワクチン接種後にも心筋炎・心膜炎を疑う報告を稀に認める（2022 年 6 月 12 日までの国内疑い報告件数は 1,022 件）。長期的な予後は調査中だが、自然感染と比較して、頻度は低く予後も良好であることなどから、各国において予防接種による有益性はリスクを上回ると評価されている。

血栓塞栓症：肺塞栓症や急性期脳卒中などの血栓塞栓症が報告され、高い致死率との関連が指摘されている。中等症以上を中心に予防的な抗凝固療法が広く施行されるようになった最近の日本国内の調査では、COVID-19 入院患者 2,894 名（2021 年 4～9 月に入院）のうち、55 名（1.9 %）に血栓塞栓症（脳梗塞 9 名、心筋梗塞 2 名、下肢動脈血栓塞栓症 1 名、深部静脈血栓症 18 名、肺血栓塞栓症 21 名）を認めた。COVID-19 の重症度が高い症例ほど血栓塞栓症の合併率が高いと考えられる。多くは COVID-19 の増悪期に合併するが、回復期に発生することもある。


炎症性合併症：重症患者では、サイトカイン放出症候群に類似した、持続的な発熱、炎症マーカーの上昇などを伴う病態を呈することがある。また、炎症性合併症としてギラン・バレー症候群（発症後 5～10 日）や、川崎病に類似した臨床的特徴を持つ多系統炎症性症候群（「2 臨床像：5 小児例の特徴」を参照）も欧米を中心に小児で報告されている。

図 2-7 70 代男性（COVID-19 肺炎：重症）



基礎疾患として肥満（BMI 28.5）、急性呼吸不全のため挿管・人工呼吸管理となった。転院時の血液検査で CRP 20.56 mg/dL、D ダイマー 140.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$ と著明高値を認めたため、造影 CT を実施したところ、複数の右肺動脈に血栓（矢頭）があり、右肺動脈血栓塞栓症と診断した。

図 2-8 80 代男性（COVID-19 肺炎：重症）



基礎疾患として未治療の 2 型糖尿病。人工呼吸管理中に、D ダイマー が 81.3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ と著明高値となった。人工呼吸器離脱に向けて鎮静薬を減量するが覚醒がなく、頭部単純 CT を撮影したところ、複数の部位に出血性梗塞（矢頭）を認めた。

他の病原体との重複感染，二次性感染症：COVID-19 における重複感染，二次性感染症に関するエビデンスは限られている。欧州では入院時における細菌の重複感染症の合併率は 3.5 % であるものの、入院中の二次性細菌感染症の合併は 15 % にのぼると報告されている。欧州の多施設研究では侵襲性肺アスペルギルス症（CAPA:COVID-19-associated pulmonary aspergillosis）を ICU 入室例の 18.4 % に認めた。高齢，人工呼吸器使用，トシリズマブの併用が CAPA と関連し，予後不良因子（90 日死亡率：57 % vs 非 CAPA 例 29 %）であった。一方，日本呼吸器学会の調査では人工呼吸器管理例でも 0.54 % と低率であった。国際的な診断基準に基づいた疫学研究が日本国内でも必要である。ムーコル症の合併は最近の総説によるとインドをはじめ少なくとも 18 カ国から報告されている。鼻脳型が多く，致死率が高い。環境要因に加え，コントロール不良の糖尿病やステロイド使用などが原因と推測されている。日本国内ではムーコル症の増加は報告されていない。

また，COVID-19 で入院した患者についての 14 の研究でのウイルス感染合併の頻度をまとめたメタアナリシスでは，他のウイルスとの重複感染は 3 % であった。

5. 小児例の特徴

COVID-19 の小児例は、これまで成人例に比較して症例数が少なかったが、検査陽性者に占める小児例の割合が増加傾向にある(2022年3月15日現在:10歳未満12.5%,10代13.4%,20歳未満の死亡10例)。

一方、小児例においては、無症状者/軽症者が多いことが特徴である。しかし、無症状者/軽症者であってもPCR法などで検出されるウイルスゲノム量は有症状者と同様に多く、呼吸器由来検体のみならず、便中への排泄も長期間認められることが報告されている。

国内小児例の臨床的特徴、小児の重症度、小児における家庭内感染率、COVID-19流行下における小児の予防接種、小児多系統炎症性症候群(MIS-C)について概説する。

【国内小児例の臨床的特徴】

2020年1月~2021年2月までに入院した18歳未満小児入院例1,038例(年齢中央値9歳)を対象とした後方視的調査では、308例(29.7%)が入院時無症状であったと報告されている。年齢群別に見ると、24カ月未満と13歳以上において、無症状者の割合が低かった(入院時無症状の割合:20.1%[24カ月未満],41.4%[2歳以上13歳未満],18.0%[13歳以上])。最もよく見られた症状は、咳嗽(37.1%)であり、38℃以上の発熱を認めたのは10.3%であった。嗅覚障害・味覚障害は年長児(13~17歳)で6歳以上13歳未満児より多かった(13~17歳:23.7%・24.7%,6歳以上13歳未満:6.0%・9.8%)。酸素投与が行われた症例は2.1%であり、人工呼吸器あるいはECMOを必要とした症例はなかった。予後は良好であり、2021年2月28日時点では、死亡例は0であった。入院期間は症状の有無にかかわらず中央値8日間と比較的長期の入院を要しており、調査対象期間における小児例の入院は主に感染拡大予防を目的としていたものであったことを示唆している。

日本小児科学会による調査結果では、オミクロン株流行後には、発熱、痙攣、咽頭痛、嘔吐などの症状の出現頻度が増加している。成人患者と比較し低頻度ではあるが、小児患者においても3.2%に頭痛、倦怠感、嗅覚・味覚障害などの罹患後症状を認めている(2022年3月20日時点)。

【小児の重症度】

小児COVID-19患者の基礎疾患の有無と重症化に関するシステマティックレビュー・メタアナリシス(42研究,基礎疾患あり:9,353例,基礎疾患なし:275,661例)において、重症化率は基礎疾患ありで5.1%,なしで0.2%,重症化の相対リスク比は1.79(95%CI:1.27~2.51),死亡の相対リスク比は2.81(95%CI:1.31~6.02)であった。また、基礎疾患のない患者における重症化因子では、肥満の相対リスク比が2.87(95%CI:1.16~7.07)であった。

アメリカにおける小児COVID-19入院患者(2020年3月~2021年5月)の重症化因子の検討において、2歳未満(745例)における調整リスク比は、慢性肺疾患2.2(95%CI:1.1~4.3),神経疾患2.0(95%CI:1.5~2.6),心血管疾患1.7(95%CI:1.2~2.3),早産児1.6(95%CI:1.1~2.2),気道系奇形1.6(95%CI:1.1~2.2)であった。2~17歳(1,548例)における調整リスク比は、経管栄養2.0(95%CI:1.5~2.5),糖尿病1.9(95%CI:1.6~2.3),肥満1.2(95%CI:1.0~1.4)であった。

カタールにおける小児COVID-19患者の重症度をデルタ株流行期(2021年6月1日~2021年11月6日)とオミクロン株流行期(2022年1月1日~2022年1月15日)の各985例で検討した。デルタ株では軽症84.2%,中等症15.7%,重症0.1%であり、オミク

ロン株では軽症 97.8 %，中等症 2.2 %，重症 0 %であった。

COVIREGI-JP/REBIND において、2020 年 10 月～2021 年 5 月（デルタ株以前）と比較し、2021 年 8 月～10 月（デルタ株流行期）に登録された小児入院症例では、ICU に入院した症例が多かった（デルタ株以前：0.1 %，デルタ株流行期：1.4 %），ICU 入院例（6 例）のうち半数に基礎疾患を認めたと、人工呼吸管理や死亡を認めなかった。

日本小児科学会レジストリ調査における、15 歳未満の 5,129 例（2020 年 2 月 1 日～2022 年 2 月 20 日）を、①流行初期（2020 年 2 月～2021 年 7 月）2,830 例，②デルタ株流行期（2021 年 8 月～12 月）1,241 例，③オミクロン株流行期（2022 年 1 月～2 月 20 日）1,058 例に分けて検討した。肺炎の合併率は 1.1～1.6 % と成人より低率で、酸素投与、呼吸・循環管理、ステロイド全身投与などの治療介入についても、デルタ株やオミクロン株の流行後も大きな変動はなかった。

【小児における死亡例】

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（2022 年 7 月 5 日時点）によると、2020 年の COVID-19 流行開始から 2021 年末までの約 2 年間における国内小児累積死亡報告数は 10 歳未満 0 例，10 歳代 3 例の合計 3 例であった。オミクロン株流行後の 2022 年 1 月以降、国内小児死亡報告数は増加しており、同年 6 月までの 6 カ月間で新たに 12 例の死亡が報告され、累積死亡報告数は 15 例となった。死亡時の年齢は 10 歳未満が 7 例，10 歳代が 8 例であった。流行期間を通して、小児における致死率の上昇は確認されていないが、国内では小児の SARS-CoV-2 感染者の絶対数が増加していることから、今後も 10 歳未満を含む小児の重症例の増加には注意が必要である。

【小児における家庭内感染率】

日本小児科学会の小児症例レジストリ調査「データベースを用いた国内発症小児 Coronavirus Disease 2019（COVID-19）症例の臨床経過に関する検討」で公開されているデータでは、20 歳未満症例 7,089 例の中で、4,369 例（62 %）において家族（父親 1,542 例，母親 1,371 例，両親 253 例，同胞 717 例，祖父母 263 例，その他 223 例）が先行感染者であり、学校関係者および幼稚園・保育所関係者からの感染はそれぞれ 10 %，8 %であった（2022 年 5 月 27 日時点）。

一方で、国内でオミクロン株の流行が顕在化した 2022 年 1 月以降に報告された 2,753 例の小児に限定すると、家族内感染は 1,322 例（48 %）に留まっており、学校関係者および幼稚園・保育所関係者からの感染はそれぞれ 17 %，12 %まで増加した。さらに、オミクロン株流行前は、父親から子どもへの感染が約 4 割を占めていた家族内感染は、オミクロン株の流行後、父親 326 例（24 %），母親 354 例（27 %），両親 38 例（3 %），同胞間 484 例（37 %），その他 120 例（9 %）となっており、母親から子ども，および同胞間での感染割合が増加した。

同様に幼稚園・保育所における感染も子ども同士 203 例（63 %），成人から子ども 31 例（10 %），不明 87 例（27 %）となっており、主な感染経路は教師や保育士から子どもへの感染から、子ども同士の感染へ移行した。

明確な感染源が不明な小児の割合は、オミクロン流行以前は 10 %程度に留まっていたが、オミクロン流行後は 19 %まで増加していた。

【COVID-19 流行下における小児の予防接種】

COVID-19 流行による世界的な予防接種率の低下により、世界全体でのワクチンで予防できる疾患（VPD）に対する集団免疫が低下することが懸念されている。

COVID-19 流行下でも、すべての年齢において推奨される接種スケジュールを遵守することは、それぞれのワクチンの有効性および安全性を最大限確保するうえでも非常に重要である。一方で保護者が安心して接種するためには、電話などで事前にかかりつけ医等と接種日時を調整するなどの工夫も必要である。また、やむを得ず接種が遅れたワクチンがある場合は、なるべく早期にキャッチアップ接種をする必要がある。地方自治体によっては定期接種時期を超えていても特例として、定期接種に準じた接種を認めている自治体もあるので、居住地域の保健所に相談してもらいたい。

【小児多系統炎症性症候群 MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children】

欧米では2020年2月以降のCOVID-19パンデミックに伴い、20歳以下の感染者の中に複数臓器に強い炎症を認める小児多系統炎症性症候群（MIS-C）を発症し、その中に川崎病と類似した症例のあることが報告された。

典型的な経過は、無症状・軽症のCOVID-19罹患から2～6週後に、高熱と下痢、嘔吐、腹痛などの消化器症状と、前後して血圧低下、ショック、心不全を呈し、しばしば発疹や眼球結膜充血、口唇・口腔粘膜の発赤やいちご舌、指趾の発赤など、川崎病に類似した症状群を伴う。36%では川崎病の診断基準を満たし、30%では不全型とも診断しうる。一部には川崎病と同様に冠動脈の拡張や瘤形成が報告され、痙攣、意識障害などの神経症状や、腎障害などを併発する例もある。多くの炎症性マーカーが上昇する。

日本小児科学会・日本集中治療医学会による小児重症COVID-19 registryによれば、2021年7月～2022年1月までに11例（うち死亡0例）のMIS-Cが報告されている。その合併率は米国に比べはるかに少なく、川崎病の人種差とは対照的に東アジア人種には発症しにくい要因のあることが示唆される。症例報告された4例は、年齢9～16歳（平均11歳）、男児3例で、COVID-19罹患から平均28日で高熱と強い消化器症状で発症した。川崎病主要6症状を3例に認めた。発症から数日以内にショックとなり、急性心筋炎の診断例もあった。入院時検査値（平均）は、CRP 22.1 mg/dL、好中球比率92%、リンパ球比率3.1%、血小板数16.9万/μL、血清ナトリウム130 mEq/L、フェリチン、Dダイマー、IL-6やBNPまたはNT-proBNPの上昇など、欧米の報告と特徴が一致している。発症時には抗原やPCRはすでに陰性化している例があるので、血清診断が必要である。補液と同時にカテコラミンや利尿薬を併用した慎重な循環管理が必要であり、川崎病と同様に免疫グロブリン大量静注と、症例によっては、ステロイド（プレドニゾロン2 mg/kgあるいはメチルプレドニゾロン30 mg/kgのパルス療法）投与が行われた。入院期間は14～21日で死亡例はない。冠動脈拡張は1例（最大時のZスコア3.9）のみで回復期には正常化した。

オミクロン株による小児感染者の増加に伴い、MIS-Cの症例が今後増加する可能性があり、注意が必要と考えられる。

〈参考〉

- ・ Tsankov BK, et al. Severe COVID-19 infection and pediatric comorbidities: A systematic review and meta-analysis. *Int J Infect Dis* 2021.
- ・ Woodruff RC, et al. Risk factors for severe COVID-19 in children. *Pediatrics* 2021.
- ・ Butt AA, et al. COVID-19 disease severity in children infected with the Omicron variant. *Clin Infect Dis* 2022.
- ・ 日本小児科学会「データベースを用いた国内発症小児 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 症例の臨床経過に関する検討」の中間報告：第3報 オミクロン株流行に伴う小児 COVID-19 症例の臨床症状・重症度の変化（2022年3月7日）

6. 妊婦例の特徴

国内外の臨床統計から、妊婦が同年齢の女性と比較して、特に COVID-19 に罹患しやすいということはない。しかし、妊娠後半期に感染すると、早産率が高まり、患者本人も重症化しやすいという事実が明らかになった。一方、妊娠初期・中期の感染で胎児に先天異常を起こすという報告はなく、子宮内感染も稀である。

日本産科婦人科学会（周産期委員会）事業 COVID-19 妊婦レジストリによれば、2022 年 5 月 5 日までに登録された感染妊婦 967 例中、軽症 708 例（73 %）、中等症 I 128 例（13 %）、中等症 II 118 例（12 %）、重症 13 例（1.3 %）であった。母体死亡の登録はなかった。特にデルタ株を主体とした流行（2021 年 6～11 月）において、中等症 II・重症例が多かった。

年齢 31 歳以上、妊娠 21 週以降の感染、妊娠前 BMI 25 以上、喘息を中心とする呼吸器疾患等の併存疾患（既往・現症の存在など）が重症化のリスク因子であった。欧米ではこれに加えて、人種や喫煙歴、妊娠高血圧症候群、妊娠性糖尿病、血栓傾向などがリスク因子として報告されている。ワクチン接種歴が明らかな感染妊婦 661 例中、86 %が未接種であった（中等症 II・重症 81 例のすべてが未接種）。

諸外国の統計では、妊娠中のワクチン接種は新生児の入院リスクを減少させる。死産、あるいは母児ともに生命にかかわる事態に陥ったのは、すべて未接種者であったと報告されている。諸外国でもわが国でも、妊娠中のワクチン接種による母体と胎児・新生児に対する奇形や流産などの重篤な有害事象の増加はない。そのため、日本産科婦人科学会・日本産婦人科感染症学会では、すべての妊婦に週数を問わず、積極的なワクチン接種を推奨している。

COVIREGI-JP/REBIND においても、2020 年 1 月～2021 年 4 月に登録された女性（15～45 歳未満）入院患者（妊婦 187 例、非妊婦 935 例）の解析から、妊婦群（18 例、9.6 %）が非妊婦群（46 例、4.9 %）より中等症・重症患者の割合が高いことが判明した。また、感染妊婦（254 例）を軽症群と中等症・重症群で比較したところ、妊娠中期（14 週）以降（OR 5.3 [95%CI: 1.2～23.1]）、基礎疾患（喘息、糖尿病、高血圧など）の存在（OR 3.9 [95%CI: 1.2～12.5]）が中等症・重症と関連していた。

〈参考〉


- ・出口雅士, 山田秀人. 日本における COVID-19 妊婦の現状 ～妊婦レジストリの解析結果（2022 年 5 月 5 日迄の登録症例）. 2022.6.7.
- ・Halasa NB, et al. Effectiveness of maternal vaccination with mRNA COVID-19 vaccine during pregnancy against COVID-19-associated hospitalization in infants aged <6 months-17 states, July 2021- January 2022.
- ・Engjom H, et al. Severe COVID-19 in pregnancy is almost exclusively limited to unvaccinated women-time for policies to change. Lancet Reg Health Eur 2022.
- ・Shoji K, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in pregnant women: a propensity score matched analysis of the data from the COVID-19 Registry Japan. Clin Infect Dis 2022.
- ・Wadman M. Studies reveal dangers of SARS-CoV-2 infection in pregnancy. Science 2022.
- ・Goldshtein I, et al. Association of BNT162b2 COVID-19 vaccination during pregnancy with neonatal and early infant outcomes. JAMA Pediatr 2022.
- ・日本産科婦人科学会周産期委員会・周産期における感染に関する小委員会. 妊婦の新型コロナウイルスワクチン接種に関する WEB アンケート調査結果について. 2022.1.12.

7. 罹患後症状

COVID-19 罹患後の一部の患者に、急性期症状の持続や新たな症状の出現、症状の再燃を認めることがある。WHO はこれらの症状が少なくとも2カ月以上続き、他の疾患で説明がつかないものを COVID-19 後の症状（post-COVID-19 condition：罹患後症状）と定義している。代表的な罹患後症状を図 2-9 にまとめた。

これらの罹患後症状は時間の経過とともにほとんどの患者で改善すると考えられるが、さらに長期の経過でどのように推移するかは今後の検討課題である。罹患後症状の詳細や具体的な患者の診察とケアについては、『本手引き別冊：罹患後症状のマネジメント』を参照のこと。

図 2-9 代表的な罹患後症状



◆引用・参考文献◆

- ・新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊：罹患後症状のマネジメント 第1版, 2022.
- ・厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期的予防接種の実施に係る対応について (2020.3.19 事務連絡).
- ・国立感染症研究所. 予防接種法に基づき医療機関等から予防接種後副反応疑い報告として届けられた 新型コロナワクチン接種後の心筋炎関連事象の特徴. 2022.2.18.
- ・国立感染症研究所. 新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査の結果について (最終報告). IASR 2021.
- ・国立感染症研究所. 感染症発生動向調査及び積極的疫学調査により報告された新型コロナウイルス感染症確定症例 516 例の記述疫学 (2020.3.23).
- ・国立感染症研究所. SARS-CoV-2 B.1.1.529 系統 (オミクロン株) 感染による新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査 (第5報) : 疫学的・臨床的特徴. 2022.2.18.
- ・国立感染症研究所. SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統 (オミクロン株) について (第8報) 2022.2.18.
- ・平良勝也, ほか. 沖縄県における SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統 (オミクロン株) 症例の実地疫学調査報告 (続報). IASR 2022.2.18.
- ・日本産婦人科感染症学会・日本産科婦人科学会. COVID-19 ワクチン接種を考慮する妊婦さんならびに妊娠を希望する方へ; 第2版. 2021.5.12.
- ・日本小児科学会. 新型コロナウイルス感染症流行時における小児への予防接種について 2020 (2020.10.27).
- ・日本小児科学会. 小児 COVID-19 関連多系統炎症性症候群 (MIS-C/PIMS) 診療コンセンサスステートメント. 2021.9.16.
- ・Adachi T, et al. Clinicopathologic and immunohistochemical findings from autopsy of patient with COVID-19, Japan. Emerg Infect Dis 2020.
- ・Aizawa Y, et al. Changes in childhood vaccination during the coronavirus disease 2019 pandemic in Japan. Vaccine 2021.
- ・Allotey J, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020.
- ・Attaway AH, et al. Severe covid-19 pneumonia: pathogenesis and clinical management. BMJ 2021.
- ・Baba T, et al. Multisystem inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 in a Japanese girl. Pediatr Int 2021.
- ・Bellino S, et al. COVID-19 disease severity risk factors for pediatric patients in Italy. Pediatrics 2020.
- ・Carfi A, et al. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA 2020.
- ・Carole H, et al. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med 2021.
- ・Cevik M, et al. Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. BMJ 2020.
- ・Covid Data Tracker Weekly Review, Interpretive Summary for January 7, 2022.
- ・Feldstein LR. Multisystem inflammatory syndrome in U.S. children and adolescents. N Engl J Med 2020.
- ・Fukuda S, et al. A case of multisystem inflammatory syndrome in children in a Japanese boy: with discussion of cytokine profile. Mod Rheumatol Case Reports 2021.
- ・Gandhi RT, et al. Mild and moderate Covid-19. N Engl J Med 2020.
- ・Gupta A, et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020.
- ・Halfmann PJ, et al. SARS-CoV-2 Omicron virus causes attenuated disease in mice and hamsters. Nature 2022.

- Hayakawa S, et al. Covid-19 pandemic and pregnancy. *J Obstet Gynaecol Res* 2020.
- Hayakawa S, et al. Anti-SARS-CoV-2 vaccination strategy for pregnant women in Japan. *J Obstet Gynaecol Res* 2021.
- Hoenigl M, et al. The emergence of COVID-19 associated mucormycosis: a review of cases from 18 countries. *Lancet Microb* 2022.
- Horiuchi H, et al. COVID-19-related thrombosis in Japan: Final report of a questionnaire-based survey in 2020. *J Atheroscler Thromb* 2021.
- Hou YJ, et al. SARS-CoV-2 reverse genetics reveals a variable infection gradient in the respiratory tract. *Cell* 2020.
- Kanegaye JT, et al. Recognition of a Kawasaki disease shock syndrome. *Pediatrics* 2009.
- Koehler P, et al. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. *Lancet Infect Dis* 2021.
- Komine-Aizawa S, et al. Placental barrier against COVID-19. *Placenta* 2020.
- Lansbury L, et al. Co-infections in people with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *J Infect* 2020.
- Made CI, et al. Presence of genetic variants among young men with severe COVID-19. *JAMA* 2020.
- Matsunaga N, et al. Clinical epidemiology of hospitalized patients with COVID-19 in Japan: Report of the COVID-19 REGISTRY JAPAN. *Clin Infect Dis* 2020.
- Menni C, et al. Symptom prevalence, duration, and risk of hospital admission in individuals infected with SARS-CoV-2 during periods of omicron and delta variant dominance: a prospective observational study from the ZOE COVID Study. *Lancet* 2022.
- Mi SH, et al. Viral RNA load in mildly symptomatic and asymptomatic children with COVID-19, Seoul. *Emerg Infect Dis* 2020.
- Miller E, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in the household setting: a prospective cohort study in children and adults in England. *J Infect* 2021.
- Miyazato Y, et al. Prolonged and late-onset symptoms of coronavirus disease 2019. *Open Forum Infect Dis* 2020.
- Naibandian A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nat Med* 2021.
- Nishimoto Y, et al. The current status of thrombosis and anticoagulation therapy in patients with COVID-19 in Japan: from the CLOT-COVID study. *J Cardiol* 2022.
- Oxley TJ, et al. Large-vessel stroke as a presenting feature of Covid-19 in the young. *N Engl J Med* 2020.
- Patel A, et al. Multicenter epidemiologic study of coronavirus disease-associated mucormycosis, India. *Emerg Infect Dis* 2021.
- Peckham H, et al. Male sex identified by global COVID-19 meta-analysis as a risk factor for death and ITU admission. *Nat Commun* 2020.
- Prattes J, et al. Risk factors and outcome of pulmonary aspergillosis in critically ill coronavirus disease 2019 patients—a multinational observational study by the European Confederation of Medical Mycology. *Clin Microbiol Infect* 2021.
- Riphagen S, et al. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. *Lancet* 2020.
- Sakurai A, et al. Natural history of asymptomatic SARS-CoV-2 infection. *N Engl J Med* 2020.
- Salim SH, et al. In-hospital cardiac arrest in critically ill patients with covid-19: multicenter cohort study. *BMJ* 2020.
- Saurabh R, et al. Cardiovascular magnetic resonance findings in competitive athletes recovering from COVID-19 Infection. *JAMA* 2020.
- Shoji K, et al. Comparison of the clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in children before and after the emergence of Delta variant of concern in Japan. *J Infect Chemother* 2022.
- Sigal A, et al. Estimating disease severity of Omicron and Delta SARS-CoV-2 infections. *Nat Rev Immunol* 2022.
- Sudre CH, et al. Attributes and predictors of long COVID-19. *Nat Med* 2021.
- Summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA* 2020.
- Takasago S, et al. Case report: Changes in cytokine kinetics during the course of disease in a Japanese patient with multisystem inflammatory syndrome in children. *Front Pediatr* 2021.
- Takashita E, et al. Efficacy of antibodies and antiviral drugs against Covid-19 omicron variant. *N Engl J Med* 2022.
- Takazono T, et al. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis: a nationwide survey by the Japanese Respiratory Society. *ERJ Open Res* 2021.
- Uchida M, et al: Multisystem inflammatory syndrome in children — A new syndrome complicated with acute heart failure following severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection —. *Circ J* 2021.
- UK Office for National Statistics. Comparing the risk of death involving coronavirus (COVID-19) by variant, England: December 2021. 22 Feb 2022.
- Verdoni L, et al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. *Lancet* 2020.
- Wei SQ, et al. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *CMAJ* 2021.
- WHO. COVID-19 Clinical management Living guidance. 23 Nov 2021.
- Wichmann D, et al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with Covid-19. *Ann Intern Med* 2020.
- Wu Z, et al. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China : Summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA* 2020.
- Xie Y, et al. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. *Nat Med* 2022.
- Yasuhara J, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review and meta-analysis. *Pediatric Pulmonology* 2020.
- Zambrano LD, et al. Update: Characteristics of symptomatic women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status — United States, January 22–October 3, 2020. *MMWR* 2020.
- Zhang Q, et al. Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. *Science* 2020.

3

症例定義・診断・届出

1. 症例定義

流行初期は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して、病原体診断と届出を行う体制であったが、2020年2月1日から指定感染症としての届出が開始された。2021年2月13日より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更された。

分類	定義	具体例・備考

【注】地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合において可能となっている。詳細は厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について(2022.1.24 発出)」を参照すること。 <https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf>

（参考）

- ・2021年2月3日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について」（新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係）
- ・2021年2月10日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について（新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係）」に関するQ & Aについて
- ・2022年1月24日 発出（2022年1月28日一部改正）「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」

届出に基づき、都道府県知事等が入院勧告・措置できる対象として、重症化リスクの高い患者や中等症・重症の患者等が定められている。

表 3-1 入院勧告・措置の対象

--

発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ (参考)

- <住民に対して周知すること>
- 発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話相談すること。
 - 相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること。
- <都道府県等や地域の医療関係者で整備すること>
- 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。
 - その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講ずること。




表 3-2 疑い患者の要件

(This table content is obscured by a large black redaction box.)


(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事等に届け出る基準。2020.5.13.改訂)

表 3-3 濃厚接触者の定義

(This table content is obscured by a large black redaction box.)

(積極的疫学調査実施要領について。2021.1.8.改訂)

表 3-4 接触確認アプリ（COCOA）で通知を受けた者について

The table content is completely redacted with a solid black background.

2. 病原体診断

COVID-19 の検査診断は開発中であり，検査法や適切な検体などの情報は今後も変更される可能性がある。詳細は『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針』を参照することが望ましい。

【検査の種類】

1) 核酸検出検査

SARS-CoV-2 に特異的な RNA 遺伝子配列を増幅し，これを検出する検査法である。感度が高いが，短所として，検査時間が長い（1～5 時間），専用の機器および熟練した人材が必要，高コストなどがあげられる。

〈**リアルタイム PCR**〉 ウイルスのコピー数の比較や推移が推定できることなどから信頼性が高い。

〈**LAMP, TMA 法等の等温核酸増幅法**〉 簡便な機器のみで実施でき，リアルタイム PCR と比較して感度は落ちるものの，反応時間が 35～50 分程度と短い。反応によって生じる濁度や蛍光強度を測定する機器では，検体種類により偽陽性が生じる可能性がある。

2) 抗原検査

- ・抗原検査（定性法，定量法）は，SARS-CoV-2 の蛋白質を検出する検査法である。
- ・抗原定性検査は有症状者（発症から 9 日以内）の確定診断として用いることができる。
- ・新規薬剤の導入に伴い，重症化リスク因子をもつ患者等での早期診断の重要性が増している。抗原定性検査は簡便・迅速なポイントオブケア・デバイスとして使用可能であり，積極的な活用を考慮する。
- ・抗原定量検査は抗原量を測定でき特異度も高い。無症状者に対する唾液を用いた検査にも使用できる。

表 3-5 各種検査の特徴*¹

新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査										
検査の対象者		核酸検出検査			抗原検査（定量）			抗原検査（定性）		
		鼻咽頭	鼻腔	唾液	鼻咽頭	鼻腔* ²	唾液	鼻咽頭	鼻腔	唾液
有症状者 (症状消退者を含む)	発症から 9 日目以内									
	発症から 10 日目以降									
無症状者										

* 1：本表では行政検査を実施するにあたって推奨される事項をとりまとめている。

* 2：引き続き検討が必要であるものの，有用な検体である。

* 3：唾液検体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意。

* 4：使用可能だが，陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。（△）

* 5：推奨されない。（-）

* 6：確定診断としての使用は推奨されないが，感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用することは可能。ただし，結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること，また，結果が陽性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には，スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。なお，スクリーニングとは，主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである。

* 詳細は『国立感染症研究所ほか，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針・第 5.1 版』を参照。

(<https://www.mhlw.go.jp/content/000914399.pdf>)

3. 血清診断

SARS-CoV-2 抗体検査は行政検査では実施されておらず，確定診断のための検査には指定されていない。また，日本国内で体外診断用医薬品として承認を得た検査試薬はなく，さまざまな検査キットが研究用試薬として市場に流通している。国立医薬品食品衛生研究所による患者血清（標準品）を用いた一斉性能評価試験の結果によると，2020 年 10 月時点で国内に流通している抗体検査キット（計 57 種類）は SARS-CoV-2 に対する抗体を検出できることが確認された。

WHO は抗体検査について，診断を目的として単独に用いることは推奨せず，疫学調査等で活用できることを示唆している。SARS-CoV-2 に対する免疫の評価に抗体を利用する方法は定まっていない。今後は，国際標準品を用いて，各キットの性能を比較していくことが必要と考えられる。

（参考）国立医薬品食品衛生研究所，新型コロナウイルスに対する抗体検査キットの一斉性能評価試験に関する報告（2021.7.14）。

4. 届 出

診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。原則として、HER-SYS（後述）を活用することになっており、これにより保健所の業務逼迫を防ぎ、迅速な情報共有を行うことができる。なお、届出事項は 2022 年 6 月 30 日から簡素化された。届出時の入院の必要性は病状などから医師の判断に基づき記載する。

【再感染が疑われる場合の注意点】

COVID-19 からの回復後にも、PCR 検査の陽性が持続することが知られている。韓国における隔離解除後に PCR 再陽性となった 226 例の解析では、陽性となった期間は、発症から平均 44.9 日間、最長で 82 日後までであった。これらの再陽性症例の濃厚接触者 790 例に感染者がいなかったことなどから、感染性はないものと考えられる。

過去に COVID-19 と診断された患者において、PCR 検査が再陽性となった場合、前回の感染からの経過期間、再陽性時の病状、PCR 検査の Ct 値などから、前回の感染による影響と考えられる場合には、届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する。

【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】


死体検案や解剖等において、新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や、COVID-19 によって死亡したと診断した場合は、直ちに最寄りの保健所に届け出る。死因が COVID-19 でない場合であっても、SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は、届出を行うことが望ましい。

また、COVID-19 の患者（無症状病原体保有者を含む）が経過中に、入退院した場合、重症化した場合、軽快した場合、死亡した場合は、速やかに HER-SYS に入力するなどにより保健所に報告する。特に、死亡時は COVID-19 以外の死亡も含めて報告する（HER-SYS 上、COVID-19 による死亡か、他原因による死亡かを選択可能である）。

【医療機関等情報支援システム（G-MIS : Gathering Medical Information System）】

厚生労働省では、全国の医療機関から、稼働状況、病床や医療スタッフの状況、医療機器（人工呼吸器等）や医療資材（個人防護具等）の確保状況等を一体的に把握することにより、病院の稼働状況を広くお知らせするほか、マスク等の物資の供給や患者搬送の調整に活用するなど必要な医療提供体制の確保に役立っている。

図 3-1 医療機関等情報支援システム（G-MIS）について




【新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS ; Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-19）】

厚生労働省では、保健所等の業務負担軽減および情報共有・把握の迅速化を図るため、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）を開発・導入した。本システムにより、「感染症法」に基づく発生届について従来の FAX による方法でなくオンライン上で可能となるとともに、感染者等の情報を電子的に入力、一元的に管理し医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で共有できるようになった。セキュアな環境下でインターネットを経由して情報をクラウド上に蓄積する。システムへの入力情報は、感染症法第 12 条による発生届や第 15 条による積極的疫学調査等として法律の規定に基づいて収集されるものであり、これらの規定に基づく国や都道府県等、保健所の業務に活用される。

図 3-2 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS*）について

* Health Center Real-time information-sharing System on COVID-19



詳しくは、厚生労働省ウェブサイトを参照

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html)

* HER-SYS の利用について（利用希望等）は、医療機関の所在地を管轄する保健所に問い合わせることとなっている

HER-SYS を活用した届出の流れ



◆引用・参考文献◆

- ・ 氏家無限ほか、新型コロナウイルスの PCR 検査が退院後に再陽性となった 4 例の報告。感染症学誌 2021.
- ・ 国立感染症研究所ほか、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針 第 5.1 版。2022.3.17.
- ・ KCDC. Findings from investigation and analysis of re-positive cases, 19 May 2020.
- ・ To KK, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) re-infection by a phylogenetically distinct severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 strain confirmed by whole genome sequencing. Clin Infect Dis 2020.
- ・ Vivek G, et al. Asymptomatic reinfection in two healthcare workers from India with genetically distinct SARS-CoV-2. Clin Infect Dis 2020.

4

重症度分類とマネジメント


以下に重症度分類および重症度別マネジメントについて解説する。入院治療の対象は都道府県の判断により一部の患者に重点化できることから、多くの軽症患者が自宅療養となっている。オンライン診療などを活用した自宅療養者への支援、病床の更なる確保や臨時医療施設の整備が図られている。本手引きでは入院治療を中心に解説する。

1. 重症度分類（医療従事者が評価する基準）

重症度	酸素飽和度	臨床状態	診療のポイント
軽 症			
中等症Ⅰ 呼吸不全なし			
中等症Ⅱ 呼吸不全あり			
重 症			

- ・ COVID-19 の死因は、呼吸不全が多いため、重症度は呼吸器症状（特に呼吸困難）と 酸素化を中心に分類した。
- ・ SpO₂ を測定し酸素化の状態を客観的に判断することが望ましい。
- ・ 呼吸不全の定義は PaO₂ ≤ 60 mmHg であり SpO₂ ≤ 90% に相当するが、SpO₂ は 3% の誤差が予測されるので SpO₂ ≤ 93% とした。
- ・ 肺炎の有無を確認するために、院内感染対策を行い、可能な範囲で胸部 CT を撮影することが望ましい。
- ・ 酸素飽和度と臨床状態で重症度に差がある場合、重症度の高い方に分類する。
- ・ 重症の定義は厚生労働省の事務連絡に従った。ここに示す重症度は中国や米国 NIH の重症度とは異なっていることに留意すること。
- ・ この重症度分類は新型コロナウイルス感染症の肺炎の医療介入における重症度である。入院に関しては、この分類の基準を満たさない患者であっても全身状態などを考慮する必要がある（p.34 「高齢者における療養のあり方について」参照）

【医療提供体制と自宅療養について】



・出典：第24回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料 2021.2.18.

図 4-1 重症度別マネジメントのまとめ

軽症	中等症Ⅰ	中等症Ⅱ	重症
呼吸療法			挿管人工呼吸 /ECMO
抗ウイルス薬	レムデシビル*1		
	モルヌピラビル*2		
	ニルマトレルビル/リトナビル *2		
中和抗体薬*2			
	ソトロピマブ*3		
	カシリビマブ/イムデビマブ*3		
免疫抑制・調節薬		ステロイド (デキサメタゾンなど)	
		バリシチニブ	
		トシリズマブ*4	
抗凝固薬		ヘパリン	

*1：軽症患者への投与は重症化リスク因子のある患者が対象
 *2：重症化リスク因子のある患者が対象
 *3：抗ウイルス薬が使用できない場合に本剤を検討（オミクロン株に対する効果減弱のおそれ）
 *4：ステロイドと併用する

- ・重症度は発症からの日数，ワクチン接種歴，重症化リスク因子，合併症などを考慮して，繰り返し評価を行うことが重要である。
- ・個々の患者の治療は，基礎疾患や患者の意思，地域の医療体制などを加味した上で個別に判断する。
- ・薬物療法は COVID-19 やその合併症を適応症として日本国内で承認されている薬剤のみを記載した。詳細な使用法は，添付文書などを参照すること。

▶高齢者における療養のあり方について

オミクロン株による流行において、入院治療について、高齢者の場合、以下のような課題があることが指摘されている。

- ・入院を契機としてフレイル（要介護の一步手前の健康状態）が進行しやすい（入院期間が長期化するほどその影響が大きい）
- ・COVID-19 を契機とする誤嚥性肺炎の併発や既存疾患の悪化
- ・生活環境の変化による転倒・骨折リスクの増大
- ・住み慣れた環境から離されることによる心理面への影響

入院治療の確保に加え、よりケアを重視した療養場所の選択とケア提供体制の充実に向けた支援が不可欠である。高齢者施設等で入所者に陽性者が発生した場合に感染制御・業務継続支援チームの派遣など医療支援の強化が図られている。

また、隔離によって運動量や活動量が低下しやすいために、隔離期間中であっても、発症早期から機能維持を目標とした適切なリハビリテーション治療を可能な限り実施することが重要である。COVID-19 患者に対してリハビリテーション医療を行う際に必要な感染対策については日本リハビリテーション医学会が取りまとめた『日本リハビリテーション医学会感染対策指針（COVID-19 含む）』（2022.2.21）等を参照すること。

〈参考〉

- ・高齢者における新型コロナウイルス感染症の療養の課題について、第 79 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料。
- ・厚生労働省事務連絡 現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検査・保健・医療提供体制の点検・強化について、2022.7.5。
- ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する理事長声明。第 80 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料。
- ・日本リハビリテーション医学会、日本リハビリテーション医学会感染対策指針（COVID-19 含む）、2022.2.21。
<https://www.jarm.or.jp/guideline/index.html>

2. 軽 症

- 特別な医療によらなくても、経過観察のみで自然に軽快することが多い。
- 内服による解熱薬や鎮咳薬などの対症療法を必要に応じて行う。飲水や食事が可能なら、必ずしも輸液は必要ない。
- 診察時は軽症と判断されても、発症 2 週目までに急速に病状が進行することがある。病状悪化はほとんどの場合、低酸素血症の進行として表れる。
- 病状が進行しているにもかかわらず、呼吸困難を自覚しない症例（silent hypoxia）があることに留意する。可能な限りパルスオキシメーターによる SpO₂ 測定が求められる。
- 発症早期（5～7 日以内）かつ重症化リスク因子のある患者では、抗ウイルス薬の適応がある。中和抗体薬は、他の治療薬が使用できない場合に検討する（オミクロン株に対する効果減弱のおそれ）。
- 重症化リスク因子があり、病状の進行が予期される場合には薬物療法を考慮する。
- 宿泊療養施設や自宅で療養・健康観察とする場合、体調不良となったらどのように医療機関を受診したらよいか、あらかじめ患者に説明しておく。
- 軽症患者であっても発症前から感染性があるため、人との接触はできるだけ避けること。同居家族がいる場合には生活空間を分けること、マスク着用や手洗いの励行を指導する。

3. 中等症

- 中等症の患者は入院して加療を行うことが原則である。レムデシビル等の治療を行うとともに、さらなる増悪に対して、酸素療法など早期に対応するためである。入院加療に際しては、隔離された患者の不安に対処することも重要である。


【中等症Ⅰ 呼吸不全なし】

- 安静にし、十分な栄養摂取が重要である。また、脱水に注意し水分を過不足なく摂取させるよう留意する。
- バイタルサインおよび酸素飽和度（SpO₂）を1日3回程度測定する。低酸素血症を呈する状態に進行しても呼吸困難を訴えないこともある。
- 重症化リスク因子を有する場合、特にワクチン接種を受けていない患者では病状の進行に注意が必要である。
- 喫煙者は禁煙が重要である。
- 一般血液・尿検査、生化学検査、血清検査、凝固関連、血液培養などを必要に応じて行う。リンパ球数の低下、CRP、フェリチン、Dダイマー、LDH、KL-6、IFN-λ3などの上昇は重症化あるいは予後不良因子として知られている。
- 血清KL-6値は、肺傷害の程度、および炎症の程度と関連し、また肺の換気機能を反映することから、肺病変の進行の程度を反映するマーカーとなりうる。
- 血液検査や肺炎の画像所見から細菌感染の併発が疑われる場合は、喀痰検査ののち、エンピリックに抗菌薬を開始する。
- 発熱、呼吸器症状や基礎疾患に対する対症的な治療を行う。
- レムデシビルの投与が考慮される。また、発症早期（5～7日以内）かつ重症化リスク因子のある患者には、経口抗ウイルス薬が考慮される。中和抗体薬は、他の治療薬が使用できない場合に検討する（オミクロン株に対する効果減弱のおそれ）。
- 現時点では、酸素投与が必要のない患者ではステロイド薬は使用すべきではない。中等症Ⅱ以上とは対照的に、予後の改善は認められず、むしろ悪化させる可能性が示唆されている。ただし、継続使用中のステロイド薬を中止する必要はない。

【中等症 II 呼吸不全あり】


- 呼吸不全のため、酸素投与が必要となる。呼吸不全の原因を推測するため、酸素投与前に動脈血液ガス検査（ PaO_2 、 PaCO_2 ）を行う。また、必要に応じて人工呼吸器や ECMO の医療体制の整う施設への転院を考慮する。
 - 肺の浸潤影が拡大進行するなど急速に増悪する場合がある。このような場合、ステロイド薬を早期に使用すべきであり、さらにレムデシビルの使用も考慮する。また、バリシチニブやトシリズマブが用いられることもある（「5 薬物療法」の項を参照）。
 - 中等症 II 以上では、ステロイド薬の使用によって予後改善効果が認められるため、強く推奨されている。ステロイド薬としてはデキサメタゾン 6 mg が最もエビデンスがあり、最長 10 日間使用する。同じ力価の他の薬剤、プレドニゾロン 40 mg、メチルプレドニゾロン 32 mg も代替使用可能と考えられる。ただし、高用量ステロイド投与（ステロイドパルス療法）の有効性と安全性は明らかになっていない。
 - レムデシビルをステロイドと併用する場合は、レムデシビルを先行または同時投与が良いとする報告がある。
 - 通常の場合、 O_2 5 L/min までの経鼻カニューラあるいは O_2 5 L/min まで酸素マスクにより、 $\text{SpO}_2 \geq 93\%$ を維持する。
 - *注：経鼻カニューラ使用時はエアロゾル発生抑制のため、サージカルマスクを着用させる。
 - 酸素マスクによる O_2 投与でも $\text{SpO}_2 \geq 93\%$ を維持できなくなった場合、ステロイド薬やレムデシビルなどの効果をみつつ、人工呼吸への移行を考慮する。
 - *注：この段階では、ネーザルハイフロー（HFNC:High-Flow Nasal Cannula）、リザーバー付きマスク（10~15 L/min）、必要に応じて覚醒下腹臥位療法などの体位管理が考慮される。エアロゾル発生による院内感染のリスクがあるため、陰圧個室あるいはレッドゾーンでの使用とする。気管挿管のタイミングを逸すると治療成績を悪化させる場合があることに十分留意する（「6 院内感染対策」を参照）。
- CPAP 使用中の睡眠時無呼吸患者においては、感染力がある場合、呼気ポートのないマスク（Non-Vent mask）および呼気ポートとマスクとの間に HEPA フィルター、人工鼻を装着可能な CPAP 機器を用いて治療を継続する。その他、HFNC では呼気終末圧付加が不十分な患者もしくは肺胞低換気がある患者に対しては、同様のフィルター付き CPAP/NPPV の使用を考慮する。いずれも治療に協力可能な患者で、陰圧室、レッドゾーンを原則とする。ただしマスクフィットが悪いとマスク周囲から漏れが生じることや、吸気相で圧が上昇する NPPV は CPAP よりエアロゾル飛散リスクが大きくなる点など、環境汚染に十分注意する必要がある。ヘルメットタイプのインターフェイスの使用に関しては、使用経験が豊富な施設が望ましい。いずれの機器に対しても、内部汚染の管理にも注意する。
- 血栓塞栓症の合併に注意し、D ダイマー測定などの評価を行い、抗凝固療法も考慮する。
 - 細菌性肺炎、ARDS、敗血症、心筋障害、急性腎障害、消化管出血の併発にも注意する。

図 4-2 呼吸療法のアルゴリズム



4. 重症

1) COVID-19 重症肺炎の特徴



【解説】

COVID-19 重症肺炎には概念として2つの病態がある。それぞれの特徴は、L型はコンプライアンス正常 (low elastance), 肺循環障害による低酸素血症 (low V/Q ratio), 肺水腫なし (low lung weight), リクルートする無気肺なし (low lung recruitability) の4つのLで、H型は肺水腫によりコンプライアンス低下 (high elastance), シヤント血流増加による低酸素血症 (high right-to-left shunt), 肺水腫のために重症 ARDS 並みの肺重量 (high lung weight), リクルート可能な含気のない肺 (high lung recruitability) の4つのHで表現される。

2) 気管挿管手技

急速に呼吸状態が悪化することに留意し、気道管理について幅広い経験をもった手技者（救急専門医，集中治療専門医など）をあらかじめ治療チームに含める。さらに、気管挿管はエアロゾルが発生する手技であることに留意し、フェイスシールドあるいはゴーグル装着に加えて空気感染予防策（N95 マスク装着）が必要である。また、エアロゾル感染のリスクを減らすために、前酸素化に引き続き、鎮静薬、鎮痛薬および筋弛緩薬をほぼ同時に連続投与し、バッグマスク換気は行わない迅速導入気管挿管 (rapid sequence induction: RSI) が選択され、さらに、直視下での挿管に比べ患者との距離が保て、口腔内を直接のぞき込まずにモニター画面を見て挿管手技が行えるビデオ喉頭鏡の使用を考慮する。

3) COVID-19 重症患者への人工呼吸戦略

a) 基本戦略

- ・ ARDS に対する肺保護戦略を用いる
- ・ 地域の医療提供体制に支障がない限り、周囲への感染拡大を最小限とする呼吸療法を実施する

b) 肺保護戦略

- ・ プラトー圧制限を行う
- ・ 換気圧制限；プラトー圧と PEEP の差を 14 cmH₂O 以下にする
- ・ pH \geq 7.25 であれば高二酸化炭素血症を容認する
- ・ 1 回換気量についてはタイプ別に対応する
- ・ 2 つのタイプに応じた PEEP 設定を行う
- ・ 過剰な自発呼吸努力に対しては筋弛緩を考慮する

- c) 環境への影響に配慮した呼吸療法の選択
 - ・低流量酸素療法を第一選択とする
 - ・高流量酸素療法や非侵襲的陽圧換気は使用しない
 - ・食道内圧測定ができる場合、内圧振幅 $> 15 \text{ cmH}_2\text{O}$ はできるだけ速やかに挿管する
 - ・人工呼吸器のガス出入口にバクテリアフィルターを使用する
 - ・人工呼吸回路の加温加湿には人工鼻あるいはフィルター機能付き人工鼻を使用する
 - ・気管吸引では閉鎖式システムを使用する
 - ・エアロゾル発生リスクの高い作業は極力行わない
- d) L 型の時の人工呼吸器の使い方
 - ・ARDS として換気設定すると肺損傷（VILI）を生じる
 - ・低酸素血症は FiO_2 の上昇で対応し、必要最低限の PEEP を設定する
 - ・高 CO_2 血症は 1 回換気量を増やすことで対応する
 - ・リクルートメントは必要ない
 - ・挿管後は深鎮静にする
 - ・PEEP を $8 \sim 10 \text{ cmH}_2\text{O}$ とする
 - ・腹臥位換気は上記に反応しない場合に実施する
- e) H 型の時の人工呼吸器の使い方
 - ・重症 ARDS として治療する
 - ・より高い PEEP ($10 \sim 14 \text{ cmH}_2\text{O}$) を使う
 - ・人工呼吸療法に抵抗性の場合は、腹臥位療法が推奨される
 - ・さらに治療抵抗性の場合は ECMO も考慮する
- f) L 型から H 型への移行
 - ・L 型から H 型へ急速に移行することがある
 - ・移行を予測できるバイオマーカーはない
- g) 腹臥位療法について
 - ・COVID-19 重症肺炎に対する腹臥位療法の開始時期や生命予後への効果を示す証拠は得られていない。
 - ・イタリアにおける後方視的多施設観察研究では、ARDS と診断された COVID-19 重症肺炎患者 1,057 人のうち 61% は少なくとも 1 回腹臥位療法が適用され、ARDS 重症度が高いほど実施回数が多かった。腹臥位療法を要した患者はより重篤で死亡率は有意に高かった。腹臥位は $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比の有意な増加をもたらした。 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比が 20 mmHg 以上増加した場合を反応ありと定義すると、反応なし患者はより重度の呼吸不全を患い、ICU でより多く死亡した（65%対 38%， $p = 0.047$ ）。
 - ・ Langer T, et al. Prone position in intubated, mechanically ventilated patients with COVID-19: a multi-centric study of more than 1000 patients. Crit Care 2021.
 - ・腹臥位療法は、少なくとも ARDS と診断され、人工呼吸療法で酸素化が維持できない場合には推奨される。

〈参考〉

- ・日本集中治療医学会 HP https://www.jsicm.org/news/upload/COVID&MVstrategy_ECMOnet_v2.pdf
- ・ビデオ教材 <http://square.umin.ac.jp/jrcm/news/news20200415.html>

*人工呼吸療法の相談は「COVID-19 対応 ECMO net コールセンター」が 24 時間対応する。

4) 体外式膜型人工肺（ECMO）

ECMO の適応には慎重かつ総合的に判断し、経験が豊富とはいえない施設においては、専門家の助言を取り入れることを前提に、ECMO 開始前の人工呼吸管理を適切に行い、導入のタイミングを逃さないことに注意が必要である。

ECMO を導入しても高度な肺線維化が生じた場合は撤退を余儀なくされることもあり、導入前にインフォームド・コンセントが必要になる。また、ECMO の禁忌・適応外の病態として、不可逆性の基礎疾患、末期癌、慢性心不全、慢性呼吸不全、その他重度の慢性臓器不全の合併が考えられる。

その他、カニュラの選択、使用する人工肺・ポンプ、回路内圧モニタリング、ECMO 中の人工呼吸器設定、ECMO 撤退・DNAR、さらには安定した長期管理を行うための詳細について不明な場合には、「NPO 法人日本 ECMOnet」に相談できる体制（専用電話番号はメールアドレスの登録がある関連学会会員に配信されている）が整えられており、積極的な利用が推奨される。

ミシガン大学の Barbaro らは、The Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) レジストリを用いて 36 カ国 213 施設で 2020 年 1 月 16 日から 5 月 1 日までに ECMO を使用した 16 歳以上の COVID-19 患者 1,035 例を解析した。その結果、ECMO 開始後 90 日以内の院内死亡率は 37.4 % (95%CI 34.4~40.4)、最終転帰が死亡または退院だった患者 968 例の死亡率は 39 %だった。また、V-V ECMO を使用した ARDS 患者の ECMO 開始後 90 日以内の院内死亡率は 38.0 % (95%CI 34.6~41.5) と推定された。COVID-19 における ECMO の治療成績は COVID-19 流行前の呼吸 ECMO の成績と同等であり、有意義なエビデンスが示されていると考えられる。しかし、2020 年 5 月 2 日~12 月 31 日の期間（日本を含む 41 カ国、349 施設）の院内死亡累積発生率は初期導入群（2,824 例）で 51.9 % (95% CI 50.0~53.8)、後期導入群（806 例）では 58.9 % (95% CI 55.4~62.3) と悪化していた。

日本国内では 2022 年 6 月 30 日現在の「NPO 法人日本 ECMOnet」からの報告では、ECMO 累積治療患者は 1,285 例で、内訳は ECMO 離脱 815 例、死亡 467 例、ECMO 実施中 3 例（ほぼ国内の全症例を網羅されている）である。年齢は 50~59 歳が最も多く、次いで 60~69 歳、40~49 歳である。また、男性症例は女性の約 4 倍である。ECMO 導入前の PEEP 値は 9 < PEEP ≤ 12 で最も多く、その群での軽快割合は 62 %である。ECMO 導入前の PF 比では 50 < PF 比 ≤ 99 が最も多く、その群での軽快割合は 65 %である。また ECMO 治療日数については、軽快例では中央値 11.0 日、死亡例では中央値 21.0 日となっている。

月毎の ECMO 開始症例数は、デルタ株が主体の 2021 年 8 月にピーク（228 例）を示した。オミクロン株流行期間中は、2022 年 2 月のピーク時でも 41 例に留まっている。

〈参考〉 NPO 法人日本 ECMO net. COVID-19 重症患者状況の集計。

5) 血液浄化療法

多臓器不全が進行する前の初期段階において、過剰な炎症反応を抑制することが期待できる急性血液浄化療法（炎症性サイトカインなど各種メディエーターの吸着除去特性があるヘモフィルターを使用した CRRT や PMX-DHP など）を考慮すべき症例もあると考えられ、国内でも臨床研究が行われている。

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会合同委員会のまとめでは、2022年7月7日現在、全国で累積7,061人の透析患者が感染者（うちECMO使用22人、呼吸機器使用270人、酸素投与1,522人）となり、うち死亡が572人と報告されている。

感染対策に留意した血液浄化療法の施行が必要である。なお、日本環境感染学会『医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド』において、透析に用いた廃液についてはHBV、HCV、HIVの場合と同様に取り扱ってもよいと記載されている。

6) 血栓症対策

- ・重症感染症および呼吸不全は、深部静脈血栓症の中等度リスク因子である。
- ・さらに、COVID-19患者においては、サイトカインストームや血管内皮障害などにより凝固亢進および線溶抑制が合併していると推定される。
- ・肥満、不動、男性、Dダイマーが正常上限の3～4倍以上を超えるような場合には、ヘパリン（低分子ヘパリンは適応外使用）などによる抗凝固療法が推奨される。
- ・未分画ヘパリンの予防投与量は確立していないが、低用量（10,000単位 / 日程度）が用いられる。適宜、APTTや血小板数を測定する。

〈参考〉日本静脈学会、肺塞栓症研究会、日本血管外科学会、日本脈管学会、日本循環器学会、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における静脈血栓塞栓症予防および抗凝固療法の診療指針 Ver.4.0, 2022.6.13.

【参考】ワクチン接種後に生じる血小板減少症を伴う血栓症

TTS : thrombosis with thrombocytopenia syndrome

VITT : vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia

新型コロナワクチン、特にアデノウイルスベクター SARS-CoV-2 ワクチン（アストラゼネカ製、ヤンセン製）の接種後（4～28日）、きわめて稀（10万人接種あたり1～11名）に重篤な血栓症の発生が報告されている。女性に多く（約80%）、脳静脈や内臓静脈などに血栓が生じることが特徴である。血液検査では血小板減少、Dダイマー高値、抗血小板第4因子抗体（ELISA）陽性（国内未承認）を認める。このため、血小板減少症を伴う血栓症（TTS）と記載されることが多いが、本症の医学的な名称は統一されていない。自己免疫性ヘパリン起因性血小板減少症との類似が指摘されている。一方、免疫グロブリン大量静注（適応外使用）の有効性が期待される。抗凝固薬として、ヘパリン類は使用を避けることが望ましく、アルガトロバン、直接作用型経口抗凝固薬（適応外使用）などの使用が想定される。

〈参考〉日本脳卒中学会・日本血栓止血学会、COVID-19 ワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き・第3版, 2021.10.

5. 妊産婦の管理

- COVID-19 に感染した妊婦の多くは無症状もしくは軽症のままに経過するが、一部は特に妊娠の後半期に重症化し、死産や本人の生命にかかわる事態に陥る。これはデルタ株のみならず、オミクロン株でも同様である。
- 無症状あるいは軽症で、自宅療養・宿泊療養中の妊婦を訪問する、あるいは電話やインターネットによる遠隔診療を行う医療者は、呼吸状態、心拍数や呼吸数とその変化などの急速な病状の進行を疑う症状、あるいは産科的異常を示唆する症状を確認する必要がある。可能であればパルスオキシメーターで血中酸素濃度を自己測定し、SpO₂ が 95% を下回る状態が続く場合は連絡をさせる。また、妊娠の時期を問わず、性器出血、持続する・あるいは周期的な腹部緊満感・子宮収縮感、破水感・胎動の減少などがある場合、妊婦健診を受けているかかりつけの産科医に直接相談するように指導する必要がある。
- かかりつけの産科医は、COVID-19 に感染した妊婦が上記のような相談をしてきた場合、速やかに地域の COVID-19 に係る周産期医療体制の関係者と連携して、適切な診察・医療を受けることができる施設への緊急搬送、あるいは自院への受診を指示すること。内科等の産婦人科医以外の医療者が診療する場合は、産科的異常を示唆する症状にも留意するとともに、日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会が 2021 年 8 月 23 日に発出した文章に記載されている症状、所見、検査結果を認める場合、入院の必要性を地域の産科医と相談する。
- COVID-19 に感染した妊婦に、必ずしも産科的な管理が必要ではなく、COVID-19 患者として内科病棟等に入院する妊婦については、呼吸数、心拍数の漸増は妊婦の代償機能が働いている徴候であるとされており、その推移に注意すること。また、酸素飽和度を適切な値 (SpO₂ 95% 以上) に保つことができるように留意する。児の娩出時期や分娩方法、妊婦に対する薬物療法については産婦人科医、小児科医と密接な連携をとる必要がある。
- COVID-19 に感染した妊婦から出生した新生児の管理については、出生直後に母親から新生児を隔離し、PCR 検査を実施し、2 回陰性を確認することで、濃厚接触とはならないという見解が 2021 年 8 月 10 日に日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本新生児成育医学会連名で出されている。

〈参考〉

- ・日本新生児成育医学会「新型コロナウイルス感染症に対する出生後早期の新生児への対応について（第 4 版）, 2020.10.29.
- ・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本新生児成育医学会 連名「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）第 5 波 医療体制のひっ迫に際しての妊婦のコロナ感染症に対する対応のお願い（続報）」(2021.8.10)
- ・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会 連名「自宅や宿泊療養施設（ホテル等）の新型コロナウイルス感染妊婦に関する対応について」(2021. 8.23)

【参考】新たなレベル分類と医療逼迫時の対応

レベル	概要
0	感染者ゼロレベル
1	維持すべきレベル
2	警戒を強化すべきレベル
3	対策を強化すべきレベル
4	避けたいレベル

*レベル 2 からレベル 3 への移行について

「3 週間後に必要とされる病床数」が各自治体において確保病床数に到達した場合または病床使用率や重症病床使用率が 50% を超えた場合に、都道府県が総合的に判断（その際には、感染状況その他さまざまな指標も併せて評価する）する。


〈参考〉

2021 年 11 月 8 日 第 10 回新型コロナウイルス感染症対策分科会「新たなレベル分類の考え方」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakuisin/bunkakai/dai10/newlevel_bunrui.pdf

<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakuisin/bunkakai/dai10/gijisidai.pdf>

【参考】自宅療養者のための診療プロトコール



出典：日本在宅ケアアライアンス、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する医療提供プロトコール（第 6.0 版）2022.1.28.

【参考】自宅療養・宿泊療養を行っている患者で酸素投与の適応となる場合の経口ステロイド薬投与における留意点

経口ステロイド薬の適応となる状況や、副作用による影響を考慮すると、ステロイド投与を行う際の病状評価および治療適応の判断にあたっては、原則として、自宅に赴いた往診医や宿泊施設内における担当医師などによる対面診療のもと、処方することが推奨される（処方例 デキサメタゾン 6 mg 分1 10日間または症状軽快まで）

- ・ただし、患者が急増し、ただちに対面診療を実施することが困難であるような状況下で、緊急性が高いと判断される場合は、事前にステロイド薬を処方しておくことも考慮される。その際には内服を開始する基準（咳嗽などの呼吸器症状があり、SpO₂ 93% 以下）を伝え、これを遵守するよう指示する。電話・オンライン診療によりステロイドの内服開始を指示することが望ましい。患者が内服を開始した場合には、必ず 24 時間以内の対面診療などによるフォローアップを行う。
- ・また、緊急的な処方が必要と医師が判断した場合は、訪問看護師が患者の側に同席しており、かつ対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを前提に、電話・オンライン診療によりステロイド薬の処方を行うことは許容される。
- ・投与の実施にあたっては、地域の実情も考慮しつつ、以下の体制を整える。
 - ・医療機関と確実に連絡が取れる状態（電話・オンライン診療を含む）
 - ・副作用も含めた必要な指導を行うこと
 - ・パルスオキシメーターで SpO₂ を正確に測ることが可能な状態（マニキュアなどがなく、正確な向きと位置で測定できているのが確認できること
 - ・糖尿病がある場合には、投与中の高血糖に留意し、必要時に血糖測定を行えること
 - ・投与後は、当日ないしは翌日中に、対面診療（または地域の実情に応じて電話・オンライン診療）によるフォローアップを行い、状態が改善するまで、高血糖、消化性潰瘍、せん妄などの副作用のモニタリングを含めた連日のフォローを行うこと
- ・適応を正確に評価することなく投与を行ったり、患者の自己判断で服薬させたりしないこと。可能であれば、呼吸数・呼吸様式などを含めた総合的な呼吸状態の評価を行うことが望ましい。
- ・酸素需要のない軽症・中等症 I の患者にはステロイド薬の投与は推奨されず、デメリットが大きくなる可能性があることに留意する。

〈参考〉日本在宅ケアアライアンス. 新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する医療提供プロトコール（第 6 版）2022.1.28.


【参考】日本救急医学会・日本臨床救急医学会による新型コロナウイルス感染症患者急増の際の入院優先度判断の考え方について

感染者の急増（サージ）に対応するためには、医療体制の予備能（サージキャパシティ：スペース、人員、薬剤等を含む資器材、運用体制）の拡充を図りつつ、入院や集中治療室入室に際し一時的に優先度を判断しながら対応することが求められる。

優先度の判断に係る普遍的な指針は存在しない。判断基準の考え方の一例として、諸外国の既報告を参考にした患者の緊急度（重症化するスピード）に基づく入院優先度判断フローを以下の図に示した。一般に、入院判断は医療機関における診療と検査結果に基づくものである。他方、新型コロナウイルス感染症患者の入院勧告・措置については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき行政機関の権限で行われる。その際医療機関における診療と検査結果を判断の参考にすることは非常に重要である。そこで本判断フローには、従来の保健所等での聞き取りから得られる「症状と重症化リスク因子の有無を中心とした評価」（ステップ 1）に、血液検査やスコア化した画像検査結果等を用いた「より高度な評価」（ステップ 2, 3, 4）が加えられている。当然ながら急増の度合いや地域の状況によっては、これらすべての評価を個々に適用できない場合もある。また、このような基準のみで判断するのではなく、個々の感染者が置かれている環境や症状の経時的変化あるいは重症化のリスク因子の程度などを考慮したうえで、入院の優先度を総合的に判断することは容認される。

このような基準やそれに基づく運用方法は、実施する医療機関や行政機関の医療の責任者の監督下で、幅広いコンセンサスの下に事前に決定されなければならない。このうえで、緊急度の評価にあたった医療従事者の個々の方針によるのではなく、当該医療機関や行政機関の事前の方針に基づいて入院優先度の判断が行われることになる。このように一定の基準を組織的方針の下で用いることによって、判断に係る公平性や一貫性が高まり、実施する医療従事者の精神的負担の軽減にもつながる。

新型コロナウイルス感染症患者の緊急度に基づく入院優先度判断フロー



出典：日本救急医学会、日本臨床救急医学会、新型コロナウイルス感染症サージ期における緊急度に基づく入院優先度判断基準について、2021.6.9.

(参考)

- 日本臨床救急医学会、新型コロナウイルス感染症流行期における発熱・呼吸器症状などを主訴とする患者の緊急度・重症度判定基準 (Version 1) について、2020.5.
- Maves RC, et al. Triage of scarce critical care resources in COVID-19 an implementation guide for regional allocation: An expert panel report of the task force for mass critical care and the American College of Chest Physicians. Chest 2020.
- Sprung CL, et al. Adult ICU triage during the coronavirus disease 2019 Pandemic: Who will live and Who will die? Recommendations to improve survival. Crit Care Med 2020.
- American College of Emergency Physicians. Emergency department COVID-19 management tool. 2021.
- Greenhalgh T, et al. What is the efficacy and safety of rapid exercise tests for exertional desaturation incovid-19? The centre for evidence-based medicine (CEBM) 2020.
- Toussie D. Clinical and chest radiography features determine patient outcomes In young and middle age adults with COVID-19, Radiology 2020.
- Singer M, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016.
- Kodama T, et al. Prediction of an increase in oxygen requirement of SARS-CoV-2 pneumonia using three different scoring systems. J Infect Chemother 2021.
- Knight SR, et al. Risk stratification of patients admitted to hospital with Covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: development and validation of the 4C mortality score. BMJ 2020.

◆引用・参考文献◆

- ・伊藤正明, 他. 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断, 治療, 予防に関するガイドライン (2017 年改訂版)
- ・厚生労働科学研究費補助金 (新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業) 「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」分担研究班. COVID-19 急性呼吸不全への人工呼吸管理と ECMO 管理: 基本的考え方. 日本集中医誌 2020.
- ・日本環境感染学会. 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 4 版, 2021.11.22.
- ・日本救急医学会, 日本集中治療医学会. 日本版敗血症診療ガイドライン 2020 (J-SSCG2020) 特別編, COVID-19 薬物療法に関する Rapid/Living recommendations 【第 4.3 版】 2022.3.29.
- ・Ackermann M, et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. N Engl J Med 2020.
- ・Barbaro RP, et al. Extracorporeal membrane oxygenation support in COVID-19: an international cohort study of the extracorporeal life support organization registry. Lancet 2020.
- ・Barbaro RP, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for COVID-19: evolving outcomes from the international Extracorporeal Life Support Organization Registry. Lancet 2021.
- ・Ehrmann S, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial. Lancet Respir Med 2021.
- ・Katagiri D, et al. Direct hemoperfusion using a polymyxin B-immobilized polystyrene column for COVID-19. J Clin Apher 2021.
- ・Li J, et al. High-flow nasal cannula for COVID-19 patients: low risk of bio-aerosol dispersion. Eur Respir J 2020.
- ・Mozaffari E, et al. Remdesivir treatment in hospitalized patients with COVID-19: a comparative analysis of in-hospital all-cause mortality in a large multi-center observational cohort. Clin Infect Dis 2021.
- ・NIH. Coronavirus diseases 2019 (COVID-19) treatment guidelines. 31 May 2022.
- ・Ronco C, et al. Coronavirus epidemic: preparing for extracorporeal organ support in intensive care. Lancet Respir Med 2020.
- ・Sato R, et al. A new challenge of unfractionated heparin anticoagulation treatment for moderate to severe COVID-19 in Japan. Glob Health Med 2020.
- ・Tachil J, et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. J Thromb Haemost 2020.
- ・WHO. COVID-19 Clinical management Living guidance. 23 Nov 2021.
- ・WHO. Corticosteroids for COVID-19. 2 September 2020.
- ・WHO. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts. 13 Aug 2020.
- ・Wong CKH, et al. Optimal timing of remdesivir initiation in hospitalized COVID-19 patients administered dexamethasone. Clin Infect Dis 2021.

5

薬物療法

COVID-19 に対する治療薬は開発が進められているところである。薬物療法を検討するに際しては、日本感染症学会が取りまとめる『COVID-19 に対する薬物治療の考え方』等も参照することが望ましい。

有効性の確立した承認薬も増加しており、これらの薬剤を重症度等に応じて適切に使用することは、患者の予後改善と医療提供体制の確保の点からも重要と考えられる。

なお、抗ウイルス薬と中和抗体薬の併用については、十分な知見がなく、各薬剤の供給も限られることから、現時点で併用療法は推奨されない。

1. 抗ウイルス薬

【レムデシビル】（RNA 合成酵素阻害薬）：

2020.5.7 特例承認，2021.1.7 適応拡大，2021.8.12 保険適用，2021.10.18 一般流通開始，
2022.3.18 適応拡大

中等症・重症の COVID-19 を対象とした 5 つのランダム化比較試験の結果から、レムデシビルはすでに人工呼吸や高流量の酸素投与に至った重症例では効果が期待できない可能性が高いが、サブグループ解析の結果からは、そこまでに至らない酸素需要のある症例では有効性が見込まれる。また、国内の臨床試験成績に基づき、中等症 I の患者にも投与可能となっている。

投与期間に関しては、挿管例を除く低酸素血症のある COVID-19 肺炎患者では 5 日間治療群と 10 日間治療群とでは有効性・副作用に差がなかったこと、および前述の軽症肺炎を対象とした 3 群での臨床試験では有意差がみられなかったことから、原則として 5 日間の投与が推奨されるが、個別の患者の背景に応じた判断を行う。

また、重症化リスク因子のある発症 7 日以内の軽症・中等症 I の COVID-19 を対象に行われたランダム化比較試験（PINETREE）において、レムデシビルを 3 日間投与した治療群では、プラセボ群と比較して COVID-19 に関連した入院または死亡を 87%減少させた。この結果を受けて、重症化リスク因子を有するなど、本剤の投与が必要と考えられる軽症患者へ適応拡大された（表 5-1 参照）。

【投与方法（用法・用量）】（添付文書抜粋）

通常、成人および体重 40 kg 以上の小児にはレムデシビルとして、投与初日に 200 mg を、投与 2 日目以降は 100 mg を 1 日 1 回点滴静注する。通常、体重 3.5 kg 以上 40 kg 未満の小児にはレムデシビルとして、投与初日に 5 mg/kg を、投与 2 日目以降は 2.5 mg/kg を 1 日 1 回点滴静注する。なお、総投与期間は 10 日までとする。

生理食塩液に添加し、30～120 分かけて点滴静注すること。

SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始し、3 日目まで投与する。ただし、SARS-CoV-2 による肺炎を有する患者では、目安として、5 日目まで投与し、症状の改善が認められない場合には 10 日目まで投与する。

小児患者における薬物動態は不明である。小児患者における国内承認用法・用量は、生理学

的薬物動態モデルによるシミュレーションに基づいて決定されたものであることに留意する必要がある。

妊婦にも有益性が危険性を上回ると判断される場合、投与できる。

（投与時の注意点）

- 1) 肝機能障害があらわれることがあるので、投与前および投与開始後は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。
- 2) Infusion reaction, アナフィラキシーを含む過敏症があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察するとともに、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、これらの発現を回避できる可能性があるため、本剤の緩徐な投与を考慮すること。

（腎機能障害のある患者への投与）

添加物スルホブチルエーテルβ-シクロデキストリンナトリウムによる尿細管障害のリスクがあり、重度の腎機能障害がある患者には投与は推奨されないが、治療の有益性が上回ると判断される場合には投与できる。日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会によると、これまでに透析患者の少なくとも 524 名にレムデシビルが投与されている（2022 年 2 月 17 日時点）。

透析患者におけるレムデシビルの有効性のエビデンスは限られているが、忍容性は一般に高いと考えられる。健常成人に比して、半減期は約 2 倍、初回投与後最高血中濃度は約 3 倍（その代謝産物 GS-441524 は 6 倍）になる。なお、血液透析により GS-441524 の血中濃度は約 50% にまで低下する。ローディングを行わず、100 mg を透析 4 時間前に投与、最大 6 回まで、などの投与法が報告されている。

わが国における 1,010 人の透析患者のデータを用いた多変量解析により、レムデシビル投与が死亡リスク低下（HR:0.60, 95 %CI 0.37~0.98, P=0.041）に寄与していることが、日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会から報告されている。

また、腎障害を有する患者におけるレムデシビル活性代謝物の血中濃度が測定され、母集団薬物動態解析モデルが構築された。腎機能に応じた投与量設計が提案されている。

（参考）Sukeishi A, et al. Population pharmacokinetic modeling of GS-441524, active metabolite of remdesivir, in Japanese COVID-19 patients with renal dysfunction. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol 2021.

【モルヌピラビル】（RNA 合成酵素阻害薬） 2021.12.24 特例承認

モルヌピラビルは、リボヌクレオシドアナログであり、SARS-CoV-2 における RNA 依存性 RNA ポリメラーゼに作用することにより、ウイルス RNA の配列に変異を導入し、ウイルスの増殖を阻害する。

日本国内の 3 施設を含む 20 カ国、107 施設で実施した多施設共同、プラセボ対照、ランダム化二重盲検試験。重症化リスクのある非重症 COVID-19 患者（目標症例数 1,550 例）の外來治療を対象にモルヌピラビル 800 mg またはプラセボを 1 日 2 回、5 日間経口投与する群に 1 対 1 で無作為割付した。目標症例数の 50% が投与 29 日目を完了した時点で行うことと事前に計画されていた中間解析において、発症 5 日以内の治療開始で偽薬群（377 名）の重症化（ここでの重症化は投与開始後 29 日目までの入院と死亡）が 53 名（14.1%）に対し、治療群（385 名）では 28 名（7.3%）と相対リスクが 48% 減少した（ $p=0.0012$ ）。この結果を受け、中間解析以降の被験者登録が中止されたが、組み入れられたすべての被験者（1,433 名）を対象とした解析の結果においては、発症 5 日以内の治療開始で偽薬群（699 名）の重症化が

68 名（9.7%）に対し、治療群（709 名）では 48 名（6.8%）と、相対リスクが 30%減少となった。また、死亡例は治療群で 1 名（0.1%）に対して、プラセボ群では 9 名（1.3%）と治療群で少なかった。

（投与方法（用法・用量））

通常、18 歳以上の患者には、モルヌピラビルとして 1 回 800 mg を 1 日 2 回、5 日間経口投与する。

（投与時の注意点）

- 1) 臨床試験における主な投与知見を踏まえ、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有するなど、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。
- 2) 本剤の有効性・安全性に係る情報は限られていることなどを踏まえ、1) の「重症化リスク因子を有するなど、本剤の投与が必要と考えられる患者」としては、臨床試験における選択基準等に基づき、重症化リスク因子（表 5-1 参照）を有する者が、本剤を投与する意義が大きいと考えられる。
- 3) 重症度の高い SARS-CoV-2 による感染症患者に対する有効性は確立していない。なお、重症度が高いとは、概ね中等症Ⅱ以上が該当すると考えられる。
- 4) SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。臨床試験において、症状発現から 6 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏づけるデータは得られていない。
- 5) 動物での非臨床毒性試験において、胎児の体重減少、流産、奇形などの影響が報告されている。妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、授乳婦については、治療上の有益性および母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続または中止を検討すること。なお、臨床試験では参加者に対して、服用中および服用後 4 日間の避妊を行い授乳を避けることが指示されていた。
- 6) 本剤の脱カプセルや懸濁・簡易懸濁投与に関しては十分なデータがないため、やむを得ない場合を除き、勧められない。詳細は下記の開発企業のサイトを参照。

MSD Connect 製品基本 Q&A ラゲブリオ R カプセル 200mg 脱カプセル・懸濁・簡易懸濁投与の可否、使用経験は？
<https://www.msconnect.jp/products/lagevrio/info/faq/>

（入手方法）

本剤は、安定的な入手が可能になるまで一般流通は行われず、厚生労働省が所有したうえで、対象となる患者が発生した医療機関および薬局からの依頼に基づき、無償で譲渡される。詳細は下記の事務連絡を参照すること。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000897828.pdf>

【ニルマトレルビル／リトナビル】（プロテアーゼ阻害薬） 2022.2.10 特例承認

ニルマトレルビルは、SARS-CoV-2 のメインプロテアーゼに作用し、その働きを阻害することによりウイルスの増殖を阻害する。リトナビルは、ニルマトレルビルの代謝を遅らせ、体内濃度をウイルスに作用する濃度に維持する目的で併用される。

国内外で実施された多施設共同、プラセボ対照、ランダム化二重盲検試験において、重症化リスクのある非入院 COVID-19 患者の外来治療を対象にニルマトレルビル 300 mg / リトナビル 100 mg またはプラセボを 1 日 2 回、5 日間経口投与する群に 1 対 1 で無作為割付した。主要有効性解析集団とされた mITT 集団（無作為化され、試験薬が 1 回以上投与され、

ベースライン後から無作為化 28 日目までに少なくとも 1 回の受診があり、ベースライン時点で COVID-19 に対するモノクローナル抗体が投与されておらず投与の予定もなく、かつ、COVID-19 の症状発現から 3 日以内に治験薬が投与された被験者) の 45% が投与 28 日目を完了した時点で行うよう事前に計画されていた中間解析において、mITT 集団のうちプラセボ群 (385 名) の 28 日目までの入院または死亡 27 名 (7.0%) に対し、治療群 (389 名) では 3 名 (0.8%) と相対リスクが 89% 減少した ($p < 0.0001$)。

この結果を受け、中間解析以降の被験者登録が中止されたが、被験者登録が中止されるまでに組み入れられたすべての被験者 (2,246 名) を対象とした解析の結果においては、mITT 集団のうちプラセボ群 (682 名) の 28 日目までの入院または死亡が 44 名 (6.5%) に対し、治療群 (697 名) では 5 名 (0.7%) と、相対リスクが 89% 減少となった。

また、副次有効性解析集団とされた mITT1 集団 (無作為化され、治験薬が 1 回以上投与され、ベースライン後から無作為化 28 日目までに少なくとも 1 回の受診があり、ベースライン時点で COVID-19 に対するモノクローナル抗体が投与されておらず投与の予定もなく、かつ、COVID-19 の症状発現から 5 日以内に治験薬が投与された被験者) における、被験者登録が中止されるまでに組み入れられたすべての被験者を対象とした解析の結果では、mITT1 集団のうちプラセボ群 (1,046 名) の 28 日目までの入院または死亡が 66 名 (6.3%) に対し、治療群 (1,039 名) では 8 名 (0.8%) と、相対リスクが 88% 減少となった。

(投与方法 (用法・用量))

通常、成人および 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の小児には、ニルマトレルビルとして 1 回 300 mg およびリトナビルとして 1 回 100 mg を同時に 1 日 2 回、5 日間経口投与する。

(投与時の注意点)

- 1) 臨床試験における主な投与経験を踏まえ、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有するなど、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。また、本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。
- 2) 重症度の高い SARS-CoV-2 による感染症患者に対する有効性は確立していない。
- 3) SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与すること。臨床試験において、症状発現から 6 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏づけるデータは得られていない。
- 4) 中等度の腎機能障害患者 (30 mL/min \leq eGFR < 60 mL/min) には、ニルマトレルビルとして 1 回 150 mg およびリトナビルとして 1 回 100 mg を同時に 1 日 2 回、5 日間の経口投与に減量すること。重度の腎機能障害患者 (eGFR < 30 mL/min) への投与は推奨しない。
- 5) 本剤は併用薬剤と相互作用を起こすことがあるため、服薬中のすべての薬剤を確認すること。また、本剤で治療中に新たに他の薬剤を服用する場合、事前に相談するよう患者に指導すること。

〈参考〉添付文書 https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/62501B5X1020_1_01/

(入手方法)

本剤は安定的な入手が可能になるまでは、一般流通は行われず、厚生労働省が所有したうえで、対象となる患者が発生した医療機関および薬局からの依頼に基づき、無償で譲渡される。詳細は下記の事務連絡を参照すること。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000896601.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/content/000932783.pdf>

2. 中和抗体薬

【ソトロビマブ】（中和抗体薬） 2021.9.27 特例承認

本剤は SARS（重症急性呼吸器症候群）に感染した患者から得られた抗体を基にしたモノクローナル抗体であり、SARS-CoV-2 を含むベータコロナウイルス属サルベコウイルス亜属に対して抗ウイルス作用を発揮することが期待されている中和抗体薬である。Fc 領域に LS と呼ばれる修飾が入ることで長い半減期を達成している。カシリビマブ/イムデビマブと同様に、発症から時間の経っていない軽症例において重症化を抑制する効果が示されている。

少なくとも 1 つ以上の重症化リスク因子（表 5-1 参照）をもつ軽症 COVID-19 患者を対象とした第Ⅲ相のランダム化比較試験では、中間解析においてソトロビマブ 500 mg 単回投与群（291 名）は、プラセボ投与群（292 名）と比較して、主要評価項目である投与 29 日目までの入院または死亡が 85 % 減少した（8 % vs 1 %）。また重篤な有害事象は、ソトロビマブ投与群で 2 %、プラセボ投与群で 6 % と、ソトロビマブ投与群のほうが少なかった。

本剤はオミクロン株（B.1.1.529/BA.2 系統、BA.4 系統および BA.5 系統）に対して有効性が減弱するおそれがあることから、他の治療薬が使用できない場合に本剤の投与を検討することとされている。2022 年 7 月 21 日現在、オミクロン株（B.1.1.529 系統）の下位系統である BA.2 系統の流行から、BA.5 系統が主流となり、置き換わったと推定されており、国立感染症研究所の疫学情報などを参考にされたい。

なお、「他の治療薬が使用できない場合」とは、他の治療薬の使用禁忌・慎重投与に該当する場合などが考えられる。

【投与方法（用法・用量）】

通常、成人および 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の小児には、ソトロビマブ（遺伝子組換え）として 500 mg を単回点滴静注する。

【投与時の注意点】

カシリビマブ/イムデビマブの項を参照のこと。

【入手方法】

本剤の配分を希望する対象医療機関は、厚生労働省が本剤の供給を委託したゼビュディ製造販売業者が開設する「ゼビュディ登録センター」に登録し、同センターを通じ、配分依頼を行う。

具体的な登録方法・依頼方法については、製造販売業者からの案内またはホームページ、専用ダイヤルに問い合わせること。

- ・ホームページ <https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/>
- ・専用ダイヤル 0120-126-993

【カシリビマブ/イムデビマブ】（中和抗体薬） 2021.7.19 特例承認

本剤は、単一の抗体産生細胞に由来するクローンから得られた SARS-CoV-2 スパイク蛋白の受容体結合ドメインに対するモノクローナル抗体であり、SARS-CoV-2 に対して抗ウイルス作用を発揮することが期待されている中和抗体薬である。中和抗体薬は、発症から時間の経っていない軽症例ではウイルス量の減少や重症化を抑制する効果が示されている。また、同居家族などの濃厚接触者や無症状病原体保有者における発症抑制効果もある。

重症化リスク因子（表 5-1 参照）を 1 つ以上もつ COVID-19 外来患者を対象としたランダム化比較試験では、入院または死亡に至った被験者の割合は、カシリビマブ/イムデビマブを各 600 mg 単回投与した群（736 例）において 1.0% であり、プラセボ群（748 例）の 3.2% と比較して、70.4 % 有意に減少した。

本剤はオミクロン株（B.1.1.529/BA.2 系統、BA.4 系統および BA.5 系統）に対して有効性が減弱するおそれがあることから、他の治療薬が使用できない場合に本剤の投与を検討することとされている。なお、SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制については、同様の対象者に使用可能な他の治療薬がないことから、慎重に投与を検討すること。

（投与方法（用法・用量））

通常、成人および 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の小児には、カシリビマブ（遺伝子組換え）およびイムデビマブ（遺伝子組換え）としてそれぞれ 600 mg を併用により単回点滴静注する。

（発症後投与時の注意点）

- 1) 臨床試験における主な投与経験を踏まえ、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有し、酸素投与を要しない患者（本手引きにおける「軽症から中等症 I」）を対象に投与を行うこと。
- 2) 高流量酸素または人工呼吸器管理を要する患者において症状が悪化したとの報告がある。
- 3) 本剤の中和活性が低い SARS-CoV-2 変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2 の最新の流行株の情報を踏まえ、本剤投与の適切性を検討すること。
- 4) SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与すること。臨床試験において、症状発現から 8 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏づけるデータは得られていない。
- 5) 新型コロナワクチンの被接種者は臨床試験で除外されているため、ブレイクスルー感染での重症化予防などの有効性を裏づけるデータは得られていない。
- 6) 本剤の投与中は患者をモニターするとともに、投与完了後少なくとも 1 時間は観察する。また、アナフィラキシーや急性輸注反応を含む重篤な過敏症が、投与中から投与 24 時間後にかけて起きることがある。

（入手方法）

本剤は当初投与対象が入院患者に限定されていたが、条件付きで医療機関の外来や「臨時的医療施設」等でない宿泊療養施設・入院待機施設、往診での投与が可能となった。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000836895.pdf>

本剤の配分・投与対象等については、適宜変更を伴うため、厚生労働省から示されている最新の事務連絡・通知を参照のこと。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000875185.pdf>

本剤の配分を希望する対象医療機関は、厚生労働省が本剤の供給を委託した製造販売業者が開設する「ロナプリーブ登録センター」に登録し、同センターを通じ、配分依頼を行うことになる。具体的な登録方法・依頼方法については、製造販売業者からの案内または中外製薬ホームページ「PLUS CHUGAI」参照、または、ロナプリーブ専用ダイヤルに問い合わせること。

- ・中外製薬ホームページ <https://chugai-pharm.jp/doctor/>
- ・ロナプリーブ専用ダイヤル 0120-002621

本剤の所有権については、厚生労働省に帰属し、ロナプリーブ登録センターを通じて対象医療機関に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象医療機関に無償譲渡されることとなる。対象医療機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令（2013年厚生労働省令第60号）に基づく手続きを行う必要があるが、当面の間は、ロナプリーブ登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代えることができる。

本剤は、「ロナプリーブ点滴静注セット 300」および「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」の2つの規格容量が特例承認されているが、当面の間は「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」が対象医療機関に配分される。

「ロナプリーブ点滴静注セット 1332」には、2回投与分の溶液が含まれている。1回分の溶液を抜き取った後のバイアルは、室温（25℃まで）で最大16時間、または2～8℃で最大48時間保存可能であり、所定の温度で保存されている場合には、当該最大保存期間内に、2症例目投与分として使用することが可能である。当該所定の温度での最大保存期間を超えた場合は、使用せず廃棄すること。なお、配分依頼時には使用予定のなかった2症例目に使用した場合および使用せずに廃棄した場合は、ロナプリーブ登録センターへ登録が必要となる。

表 5-1 軽症・中等症 I 患者を対象とした治療薬の主な臨床試験

薬剤名 (臨床試験名)	中和抗体薬		抗ウイルス薬		
	カシリビマブ / イムデビマブ (COV-2067)	ソトロビマブ (COMET-ICE)	モルヌピラビル (MOVE-OUT)	レムデシビル (PINETREE)	ニルマトレルビル /リトナビル (EPIC-HR)
29 日目までの 入院・死亡 (試験薬 vs プラセボ)					
発症からの日数					
ワクチン					
重症化リスク因子（1つ以上あれば組入）					
高齢					
肥満					
慢性腎臓病					
糖尿病					
免疫抑制状態					
心血管疾患					
呼吸器疾患					
肝疾患					
その他					

3. 免疫抑制・調節薬

【デキサメタゾン】（ステロイド薬）

英国で行われた入院患者を対象とした大規模多施設無作為化オープンラベル試験では、デキサメタゾンの投与を受けた患者は、標準治療を受けた患者と比較して致死率が減少したことが示された。この研究は6,425人の参加者を対象に行われ、デキサメタゾン群2,104人、対照群4,321人が参加した。デキサメタゾン群の21.6%、対照群の24.6%が、試験登録後28日以内に死亡した。予後改善効果は、無作為化時に侵襲的人工呼吸管理を必要とした患者で最大であり、この集団の29.0%が試験登録後28日以内に死亡したのに対し、対照群では40.7%であった。また登録時に酸素投与を必要としたデキサメタゾン投与群の21.5%が登録後28日以内に死亡したのに対し、対照群では25.0%であった。しかし、登録時に酸素投与を要しなかった集団では予後改善効果はみられなかった（RR 1.22；95% CI, 0.93~1.61, P = 0.14）。

（投与方法（用法・用量））

デキサメタゾンとして6 mg 1日1回 10日間まで（経口・経管・静注）

（投与時の注意点）

- ・40 kg未満の小児等ではデキサメタゾン0.15 mg/kg/日への減量を考慮する。
- ・肥満・過体重では用量につき個別に検討する。
- ・血糖値測定やリスクに応じた消化性潰瘍の予防も検討する。
- ・妊婦への使用は「5-4. 妊婦に対する薬物療法」参照。

【バリシチニブ】（ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤）：2021.4.23 追加承認

COVID-19と診断された入院患者1,033人を対象にレムデシビル（10日以内）に加えて、バリシチニブ（14日以内）またはプラセボ（対照）を投与したRCTでは、バリシチニブを投与された患者の回復までの期間の中央値は7日、対照群では8日であり（回復率比, 1.16；95% CI, 1.01~1.32; P = 0.03）、15日目の臨床状態の改善のオッズは30%高かった（オッズ比, 1.3；95% CI, 1.0~1.6）。また、部分解析集団において登録時に高流量酸素または非侵襲的人工呼吸を受けた患者の回復までの期間は、併用療法で10日、対照群で18日であった（回復率比, 1.51；95% CI, 1.10~2.08）。デキサメタゾンとバリシチニブの優位性の検証は現在行われているところである。

入院患者1,525人（標準療法としてステロイド投与79%、レムデシビル投与19%）を対象とした二重盲検試験（COV-BARRIER）において、主要評価項目の人工呼吸管理／死亡に至った割合に差は認められなかったが、治療開始28日以内の死亡はバリシチニブ群で有意に低かった（8.1% vs 13.1%）。

（投与方法（用法・用量））

バリシチニブとして、4 mg 1日1回 最長14日間（経口）

（投与時の注意点）

- ・中等症Ⅱ～重症の患者に入院下で投与すること。
- ・レムデシビルと併用する（添付文書）。2021年7月、米国FDAは緊急使用許可（EUA）の条件を改訂し、レムデシビルを併用しない本薬剤の使用を認めた。

- ・中等度の腎機能障害 ($30 \leq \text{eGFR} < 60$) のある患者には、2 mg 1 日 1 回経口投与とする。重度の腎機能障害 ($15 \leq \text{eGFR} < 30$) では 2 mg を 48 時間ごとに 1 回投与（最大 7 回まで）。なお、 $\text{eGFR} < 15$ では投与しない。
- ・血栓塞栓予防を行うこと。

【トシリズマブ】（抗 IL-6 受容体抗体）：2022.1.21 追加承認

SARS-CoV-2 による肺炎患者 4,116 人を対象に英国で実施された医師主導治験である RECOVERY 試験（ランダム化非盲検試験）では、28 日目までの全死亡割合はトシリズマブ群で 31%（621/2,022 例）であり、標準治療群の 35%（729/2,094 例）と比較し有意に死亡割合が低かった。当該試験におけるステロイド薬併用有無別の全死亡割合は、ステロイド薬併用ありの集団では本剤群で 29%（489/1,664 例）であり標準治療群の 35%（600/1,721 例）と比較し死亡割合が低かったが、ステロイド薬併用なしの集団では本剤群で 39%（139/357 例）であり標準治療群の 35%（127/367 例）を上回る死亡割合であった。

また、WHO において実施された SARS-CoV-2 による感染症の入院患者における全死亡と IL-6 阻害薬投与との関連性を推定するためのメタアナリシス（27 のランダム化比較試験）において、標準治療またはプラセボを投与した患者に対する IL-6 阻害薬（本剤またはサリルマブ）を投与した患者の 28 日目までの全死亡のオッズ比 [95%信頼区間] は、全体集団で 0.86 [0.79, 0.95]、ステロイド薬併用ありの集団で 0.78 [0.69, 0.88]、ステロイド薬併用なしの集団で 1.09 [0.91, 1.30] であった。このうち、本剤が用いられた 19 試験における当該オッズ比 [95%信頼区間] は、全体集団で 0.83 [0.74, 0.92]、ステロイド薬併用ありの集団で 0.77 [0.68, 0.87]、ステロイド薬併用なしの集団で 1.06 [0.85, 1.33] であり、ステロイド薬との併用下で本剤投与により全死亡割合が低下することが示唆されている。

WHO は上記の知見などを踏まえて、2021 年 7 月にトシリズマブとサリルマブについては酸素投与を要する入院患者にステロイド薬と併用することを新たに推奨した（死亡リスク低減効果は 1,000 例あたり 16 例と推計）。

（投与方法（用法・用量））

通常、成人には、副腎皮質ステロイド薬との併用において、トシリズマブ（遺伝子組換え）として 1 回 8 mg/kg を点滴静注する。症状が改善しない場合には、初回投与終了から 8 時間以上の間隔をあけて、トシリズマブ（遺伝子組換え）として 8 mg/kg を更に 1 回追加投与できる。

（投与時の注意点）

- ・酸素投与、人工呼吸器管理または体外式膜型人工肺（ECMO）導入を要する患者を対象に入院下で投与を行うこと。
- ・海外医師主導治験は室内気 SpO_2 が 92 % 未満または酸素投与中で CRP 値 7.5 mg/dL 以上の SARS-CoV-2 による肺炎患者を対象として実施され、副腎皮質ステロイド薬併用下で本剤の有効性が確認されている。当該試験の内容を熟知し、本剤の有効性および安全性を十分に理解したうえで、適応患者の選択を行うこと。
- ・海外医師主導治験では副腎皮質ステロイド薬を併用していない患者において本剤投与により全死亡割合が高くなる傾向が認められた。
- ・バリシチニブとの併用について、有効性および安全性は確立していない。

4. 妊婦に対する薬物療法

1) 有益性投与

【レムデシビル】 妊娠中使用のデータは少なく、各国の指針でも定まった記述はされていない。米国 NIH の指針では投与可能とされている。

【ニルマトレルビル/リトナビル】 妊娠中使用のデータは少ない。動物実験で胎盤関門を通過することが報告されている。併用禁忌薬が多いことから、同時に処方される薬剤に留意する。

【中和抗体薬】 カシリビマブおよびイムデビマブ、ソトロビマブのいずれも妊娠中使用のデータは少ない。米国 NIH の指針では中等度の推奨（専門家の意見）と記載されている。

【デキサメタゾン（ステロイド）】 適応は中等症Ⅱ～重症のみである。デキサメタゾンは成人患者の死亡率低下に最も実績があるが、胎盤通過性を有する。短期投与なら胎児に与えるリスクは小さいと考えられ、米国 NIH の指針では人工呼吸を要する患者に強い推奨（専門家の意見）、人工呼吸を要しないが酸素投与を要する患者に中等度の推奨（専門家の意見）と記載されている。プレドニゾロンは胎盤通過性は低いとされ、英国産婦人科学会の指針では、胎児肺成熟の必要性に応じた使い分けが示されている。

〈米国 NIH 指針〉

デキサメタゾン 6 mg 内服または静注 1日1回 10日間 または 退院までの早い方*

〈英国産婦人科学会指針〉

- ・胎児肺成熟の適応がない場合：プレドニゾロン 40 mg 内服 1日1回/またはヒドロコルチゾン 80 mg 静注 1日2回/10日間 または 退院までの早い方*
- ・胎児肺成熟の適応がある場合：①デキサメタゾン 6 mg 筋注 12時間毎 4回投与/
②次いで、プレドニゾロン 40 mg 内服 1日1回、または ヒドロコルチゾン 80 mg 静注 1日2回、①②を合わせて10日間 または 退院までの早い方*

*日本の退院基準は「症状軽快後 72 時間経過」が要件であることから、「10日間または症状軽快までの早い方」と考えてもよい。

【トシリズマブ】 妊娠中使用のデータは少ない。動物実験で胎盤関門を通過することが報告されている。

2) 禁忌

【バリシチニブ】 動物実験では催奇形性が報告されており、妊婦への投与は禁忌である。

【モルヌピラビル】 動物実験で胎児毒性が報告されており、妊婦への投与は禁忌である。

〈参考〉

- ・ NIH. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) treatment guidelines. 31 May 2022.
- ・ Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy. Version 14. 25 Aug 2021.
- ・ 国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター。【医療関係者向け】妊婦さんの新型コロナウイルス感染症について。
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri_medical.html

【参考】日本国内で開発中の主な薬剤

厚生労働省が公表している開発中の薬剤を示すこれらの薬剤は有効性や安全性が確立していないため、臨床試験に登録の上で使用されるべきである。

薬品名	分類	開発対象	参考情報
ファビピラビル			
S-217622			
イベルメクチン			
AZD7442			

〈参考〉 厚生労働省. 現在開発中の新型コロナウイルス治療薬（2022.6.28 現在）
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000959036.pdf>

【参考】国内外で開発が中止された主な薬剤

下記の薬剤は COVID-19 に対する有効性が示されず、使用すべきでない。

薬品名	分類	参考情報
ヒドロキシクロロキン		
ロピナビル・リトナビル		
カモスタット		
高度免疫グロブリン製剤		

◆引用・参考文献◆

- ・日本感染症学会. COVID-19 に対する薬物治療の考え方（第 13.1 版）. 2022.2.18.
- ・日本救急医学会・日本集中治療医学会. 日本版敗血症診療ガイドライン 2020 (J-SSCG2020) 特別編, COVID-19 薬物療法に関する Rapid/Living recommendations 【第 4.3 版】 2022.3.29.
- ・Bernal AJ, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients. *N Engl J Med* 2021.
- ・Burwick RM, et al. Compassionate use of remdesivir in pregnant women with severe coronavirus disease 2019. *Clin Infect Dis* 2021.
- ・Chen P, et al. SARS-CoV-2 neutralizing antibody LY-CoV555 in outpatients with Covid-19. *N Engl J Med* 2020.
- ・Davis MR, et al. Remdesivir and GS-441524 plasma concentrations in patients with end-stage renal disease on haemodialysis. *J Antimicrob Chemother* 2021.
- ・Diaz GA, et al. Remdesivir and mortality in patients with COVID-19. *Clin Infect Dis* 2021.
- ・FDA. Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization for Actemra (Tocilizumab) for Treatment of COVID-19. 24 June 2021.
- ・FDA. Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization of Baricitinib for Treatment of COVID-19. 28 Jul 2021.
- ・Goldman JD, et al. Remdesivir for 5 or 10 days in patients with severe Covid-19. *N Engl J Med* 2020.
- ・Gottlieb RL, et al. Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients. *N Engl J Med* 2021.
- ・Gupta A, et al. Early treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 neutralizing antibody sotrovimab. *N Engl J Med* 2021.
- ・Hammond J, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. *N Engl J Med* 2022.
- ・Horby PW, et al. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19 - preliminary report. *N Engl J Med* 2020.
- ・Horby PW, et al. Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY) : preliminary results of a randomised, controlled, open-label, platform trial. *Lancet* 2021.
- ・Kail AC, et al. Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. *N Engl J Med* 2020.
- ・Kikuchi K, et al. Survival and predictive factors in dialysis patients with COVID-19 in Japan: a nationwide cohort study. *Ren Replace Ther* 2021.
- ・Marconi VC, et al. Efficacy and safety of baricitinib for the treatment of hospitalised adults with COVID-19 (COV-BARRIER): a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled phase 3 trial. *Lancet Respir Med* 2021.
- ・Mozaffari E, et al. Remdesivir treatment in hospitalized patients with COVID-19: a comparative analysis of in-hospital all-cause mortality in a large multi-center observational cohort. *Clin Infect Dis* 2021.
- ・NIH. Coronavirus diseases 2019 (COVID-19) treatment guidelines. 31 May 2022.
- ・Nithya G, et al. A clinical study on the changing dynamics of disease severity, management strategies and outcomes of COVID-19 in patients requiring haemodialysis. *J Nephrol* 2021.
- ・Pan H, et al. Repurposed antiviral drugs for Covid-19 - Interim WHO solidarity trial results. *N Engl J Med* 2020.
- ・Salama C, et al. Tocilizumab in patients hospitalized with Covid-19 pneumonia. *N Engl J Med* 2020.
- ・Salvarani C, et al. Effect of tocilizumab vs standard care on clinical worsening in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia : a randomized clinical trial. *JAMA Intern Med* 2020.
- ・Shankar-Hari M, et al. Association between administration of IL-6 antagonists and mortality among patients hospitalized or COVID-19: A meta-analysis. *JAMA* 2021.
- ・Siemieniul RA, et al. Antibody and cellular therapies for treatment of covid-19: a living systematic review and network meta-analysis. *BMJ* 2021.
- ・Somers EC, et al. Tocilizumab for treatment of mechanically ventilated patients with COVID-19. *Clin Infect Dis* 2020.
- ・Stone JH, et al. Efficacy of tocilizumab in patients hospitalized with Covid-19. *N Engl J Med* 2020.
- ・Takashita E, et al. Efficacy of antibodies and antiviral drugs against Covid-19 omicron variant. *N Engl J Med* 2022.
- ・Takashita, et al. Efficacy of antiviral agents against the SARS-CoV-2 omicron subvariant BA.2. *N Engl J Med* 2022.
- ・Takashita, et al. Efficacy of antibodies and antiviral drugs against omicron BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 subvariants. *N Engl J Med* 2022.
- ・Weinreich DM, et al. REGN-COV2, a neutralizing antibody cocktail, in outpatients with Covid-19. *N Engl J Med* 2021.
- ・Weinreich DM, et al. REGEN-COV antibody combination and outcomes in outpatients with Covid-19. *N Engl J Med* 2021.
- ・WHO. Therapeutics and COVID-19 : living guidance. 22 Apr 2022.

6

院内感染対策

COVID-19 の院内感染事例は国内外から多数報告されており、患者から医療従事者への感染のみならず、医療従事者から患者、医療従事者間の感染事例も起きている。院内感染対策は他疾患の患者に対する医療の継続においても重要である。一方、オミクロン株の流行では、他疾患で受診・入院した患者に SARS-CoV-2 感染が判明することがまれでなくなった。効果的かつ医療現場に負担の少ない感染対策を実施していく必要がある（表 6-1）。

外来受診患者に対して、病院入口や受付などで体温測定器や問診票を用いて COVID-19 を疑う症状の有無を確認することが望ましい。疑い患者は、他の患者とは距離を保つことが可能な待機場所に案内して、できるだけ早く診察を行う。

表 6-1 医療機関における感染対策の考え方

	COVID-19 を疑う症状のない者 (感染者・濃厚接触者を除く)	感染者・濃厚接触者、COVID-19 疑い患者
標準予防策		
接触感染対策		
飛沫感染対策		
エアロゾル対策		
空間の分離 (ゾーニング)		

* 1 口腔内の診察、口腔ケア、食事介助、入浴支援など

* 2 咳嗽がある。喀痰吸引や口腔ケアを実施するなど

* 3 トイレが病室にない場合は、病棟トイレの一部を当該患者用に使用することも可


出典：厚生労働省、第 87 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料、2022.6.8. を一部編集

図 6-1 病室単位での新型コロナウイルス感染対策の 1 例

病室ゾーニングの 1 例



病室ゾーニングの見取り図（案）



■ 患者ゾーン（レッド） ■

- ・新型コロナウイルス感染症患者をケアする領域
- ・マスクに加えて必要に応じて手袋，ガウン，フェイスシールドを着用
- ・患者と濃厚な接触を行わない場合（問診，診察，検温など）には必ずしもガウンは必要ではない（ただし、移乗介助、身体リハ、むせこみ食事介助、おむつ交換などの場合にはガウン，フェイスシールドの着用を考慮）

■ 中間ゾーン（イエロー） ■

- ・ドアを開けて病室に入った領域（床テープなどで領域を明示）
- ・マスクに加えて必要に応じて手袋，ガウン，フェイスシールドを着用
- ・廃棄ボックスを設置。患者ゾーンから共通ゾーン（グリーン）に出る前に手袋・ガウン・フェイスシールドを脱ぎ廃棄
- ・中間ゾーンを通過するたびに毎回手指衛生を徹底

■ 共通ゾーン（グリーン） ■


- ・非感染患者をケアする領域
- ・マスク着用を基本とし，必要に応じて手袋を着用
- ・感染者が共通ゾーンに移動する場合には，マスク着用の上で時間的・空間的隔離，換気に注意（たとえばトイレ，シャワーなど）
- ・手袋・ガウン・フェイスシールド置き場を設置し，ここで着用する
* 中間ゾーン（イエロー）に置き場（着用場所）を設置する選択肢もある

・出典：厚生労働省，第 87 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード資料，2022.6.8.

1. 個人防護具

COVID-19 の患者（疑い患者で検体採取などの手技を行う場合を含む）の診療ケアにあたる医療スタッフは、接触予防策および飛沫予防策として、ゴーグル（またはフェイスシールド）、マスク、手袋、長袖ガウン、帽子などを着用する。気道吸引や気管挿管などエアロゾルが発生しやすい場面においては N95 マスクの着用が推奨される。

検査などのための患者移動は最小限とし、患者が病室外に出る場合はサージカルマスクを着けてもらう。検体採取時に必要な個人防護具については、表 6-2 を参照のこと。



【解説】エアロゾルが発生しやすい状況とは、気道吸引、気管内挿管、抜管、用手換気、気管切開と気管切開部でのチューブ交換、歯科口腔処置、非侵襲的換気、ネーザルハイフロー、生理食塩水を用いた喀痰誘発、下気道検体採取、吸引を伴う上部消化管内視鏡などである。

表 6-2 検体採取時の個人防護具

採取する検体	

【参考】マスクの JIS 規格

日本ではマスクに対する公的な規格・基準は整備されていなかったことから、試験方法の標準化を図り、一定の性能要件以上のマスクを国内で流通させる観点から、JIS^{*1}が制定された。規定された試験方法により試験を行い、捕集機能、圧力損失、安全・衛生項目等の性能要件を満たしていれば、材質、形状は限定しない。

今後、関係省庁と日本衛生材料工業連合会が関係する機関が連携して規格の適合性を審査し、適合したマスクには、同連合会が発行する認証番号等を表示することができる仕組みが運用される予定である。

* 1 : JIS (Japanese Industrial Standards : 日本産業規格) とは、わが国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法 (昭和 24 年法律第 185 号) に基づき制定される任意の国家規格である。

制定された日本産業規格 (JIS) の概要

番号	JIS T 9001
番号	JIS T 9002

- ・経済産業省。マスクの日本産業規格 (JIS) が制定された (2021.6.16).
<https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210616002/20210616002.html>
- ・厚生労働省。マスクに関する日本産業規格 (JIS) を制定した (2021.6.16).
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19244.html

2. 環境整備

施設の換気条件（換気回数など）を確認しておくとともに、換気設備の老朽化などがないか、点検を行う。患者（疑い例を含む）に用いる診察室および入院病床などは、陰圧室が望ましいが必須ではなく、十分な換気ができればよい。施設内に陰圧空調を備えた病室が設置されている場合は、エアロゾル発生手技が高頻度を実施される患者を優先的に収容し、陰圧空調設備を有しない施設では、エアロゾル発生手技の実施前後に病室内の換気を行うなどの対応が勧められる。

患者周囲の環境は定期的に清掃を行い、必要に応じて清拭消毒する。患者に使用した検査室（X線や CT 撮影室など）の患者が触れた場所、あるいは患者検体を扱った後の検査機器やその周囲は、清拭消毒を行う。消毒薬の空間噴霧による環境消毒で、COVID-19 に対する効果が証明されたものはなく、推奨されていない。清掃を行うスタッフは感染者への対応に準じた PPE を着用する。

COVID-19 の入院患者を、病棟の一部で病室毎のゾーニングを行うことにより管理できる。COVID-19 患者を収容している、いわゆるレッドゾーンについては日々の清掃以外の、定期的な環境消毒は必要ない。

なお、消毒薬については、（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設）ホームページを参照すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

〈参考〉

- ・厚生労働省、新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について（2021.4.7. 事務連絡）
- ・空調調和・衛生工学会、日本建築学会、新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して「換気」に関する Q & A. 2020.3.30.
<https://www.ajj.or.jp/jpn/databox/2020/200330.pdf>
- ・厚生労働省、効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について。（事務連絡 2022.6.20.）
<https://www.mhlw.go.jp/content/000953531.pdf>
- ・令和 2 年度厚生労働科学特別研究事業「新型コロナウイルス感染症に対する院内および施設内感染対策の確立にむけた研究」（研究代表者：賀来満男）『医療機関における新型コロナウイルスにおけるゾーニングの考え方』（2021.7.28.）

3. 廃棄物

COVID-19 の患者（疑い例を含む）から排出された廃棄物は、感染性廃棄物として排出する。排出する際には、廃棄物容器の表面をアルコールや抗ウイルス作用のある消毒剤含浸クロスで清拭消毒する。事前に廃棄の条件について、委託業者に確認しておくことが望ましい。

4. 患者寝具類の洗濯

患者が使用したリネン類の洗濯は、施設外に持ち出す際は 80℃・10 分間の熱水消毒または 250 ppm 次亜塩素酸ナトリウム 30 分浸漬を行った後に持ち出して洗濯するか、水溶性ランドリー袋に入れて運搬し、袋を開けずに洗濯する。施設内で洗濯する場合、通常の洗濯で構わないが、洗濯機に入れるまでは手袋、長袖ガウン、サージカルマスク、眼の防護具を着用し、洗濯物を取り扱った後、PPE 脱衣後に手指衛生を実施する。洗濯後のリネンの取り扱いの際に特別な PPE は不要である。

【参考】医療従事者が濃厚接触者となった場合の考え方

感染者が急増している地域において医療提供体制を確保するため、緊急的な対応として、医療従事者について、家庭内感染などにより濃厚接触者となった場合、下記の要件および注意事項を満たせば、医療に従事することを可能とする厚生労働省事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について（2021.8.13 発出，2022.3.16 一部改正）」が示されている。

【要件】

- 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
- 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後 14 日間経過した後（ただし、2 回目接種から 6 カ月以上経過していない場合には、2 回接種済みで、2 回目の接種後 14 日間経過した後でも可）に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
- 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査（やむを得ない場合は、抗原定性検査キット）により検査を行い陰性が確認されていること。
- 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

【注意事項】

- 新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すること。
- 感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては、格段の配慮を行うこと。
- 当該医療従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること（マスクの着用および手指衛生などに加え、処置時における標準予防策の徹底）。
- 引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
- 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
- 当該医療機関の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者および担当する患者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
- 検査期間は最終曝露日から 14 日間であること。（オミクロン株の濃厚接触者の場合は、最終曝露日から 5 日間。なお、その場合であっても、7 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用することなどの感染対策を求めると）【注】
- 検査に当たっては、「医療機関における無症状者（職員、入院患者等）への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について（再周知）」（2021. 5. 10. 付け事務連絡）のとおり、地域の实情により行政検査または自費検査で行うか判断して差し支えないものの、従来、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、感染者が一人も発生していない施設などであっても、医療機関に勤務する者について、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしてきているところであり、原則として行政検査として実施することが望ましい。

* 2022 年 3 月 17 日現在、厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応において（2022.1.5 発出，2022.2.2 一部改正）」を同時に適用することが可能である。同事務連絡において、感染急拡大が確認された場合には、B.1.1.529 系統（オミクロン株）の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者については、最終曝露日（陽性者との接触など）から 7 日間（8 日目解除）としている。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf>

また、B.1.1.529 系統（オミクロン株）の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者において、（医療関係者を含む）社会機能維持者に関しては、4 日目および 5 日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後（または 5 日目の PCR 検査または抗原定量検査の実施による陰性確認後）、5 日目から解除が可能であることが示されている。

上記いずれの場合であっても、7 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求められる。

各基準については必ず最新の厚生労働省発出の事務連絡を参照すること。

（参考）

・ 2021.8.13 発出，2022.3.16 一部改正。「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」

<https://www.mhlw.go.jp/content/000913724.pdf>

・ 2022.1.5 発出，2022.4.2.2 一部改正。「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

<https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf>

8. 妊婦および新生児への対応

COVID-19は特に妊娠後半期には増大する子宮で横隔膜が挙上するために呼吸不全を起こしやすい。新生児に産後の感染リスクがあるが、母子分離を行ってきた日本においては新生児の発症はきわめて限定的である。

帝王切開の適応など分娩方法については、母子および医療スタッフの安全と医療体制の維持などに十分に配慮し、個別に産婦人科主治医が判断する。

【感染対策】

- (1) 妊婦健診，出産に際しては標準予防策を遵守する。
- (2) 感染が疑われる患者と，他の患者（妊婦健診来院者）とは動線や待合室を分け，感染の有無にかかわらずマスクを着用してもらう。特に症状のある患者や濃厚接触者は，来院前に電話相談を受け，他の患者と別に診療する。
- (3) 産科医療機関における院内検査としてPCRあるいは迅速性のある抗原検査を推奨するが，全妊婦に行くかどうかは地域の感染状況により個別に判断する。
- (4) 感染者（疑い患者も含む）の分娩では分娩室は個室とし，換気を十分に行う。陣痛室や出産後の回復室もトイレつき個室とし，医療スタッフは院内感染予防のため手袋，マスク，ガウン，ゴーグル（またはフェイスシールド），必要に応じてN-95マスクを着用する。
- (5) 非感染者の分娩では産婦が必ずしもマスクを着用する必要はないが，分娩スタッフは十分なPPEを着用する。
- (6) COVID-19感染がなくても，帰省分娩，配偶者の立ち合い分娩は推奨しないが，地域の感染状況によって個別に判断する。
- (7) 感染妊婦では，母体の感染性が消失するまで新生児との接触は避けることが望ましい。ただし，母子同室の希望がある場合は，施設の感染対策等の状況を考慮して個別に判断することも許容される。
- (8) 新生児に感染が疑われる場合は，個室隔離，または保育器で管理とする。
- (9) 感染者の授乳については，母親が解熱し状態が安定していれば，手洗いなどを確実に行ったうえで搾乳し，介護者により母乳を与えることは可能であるが，感染リスクについては十分なインフォームドコンセントを得る。

ナースコール，テーブル，ベッド柵，床頭台などの患者周囲環境は，アルコールや抗ウイルス作用のある消毒剤で清拭消毒を行う。聴診器や体温計，血圧計などの医療機器は個人専用とし，使用ごとに清拭消毒する（「3 環境整備」を参照）。

陰圧室でない分娩室の場合，母体から児へのエアロゾル曝露を避けるために分娩台から2m以上距離をとった場所に蘇生場所を確保するか，蘇生を行う部屋を別に準備することが望ましい。手術室での分娩の場合，陰圧室の使用を第1候補とし，新生児蘇生を行う場所を分娩室での分娩と同様に確保する。

鼻咽頭吸引，呼吸補助（マスクとバッグ，ラリソールマスク／エアウェイによる人工呼吸，持続陽圧呼吸（CPAP）），挿管，胸骨圧迫，気管内への薬物（アドレナリン，サーファクタント）投与はエアロゾル発生処置と考えて対応する。蘇生メンバー全員がPPEを適切に装着する必要がある。また，可能なならば，マスクバッグや人工呼吸器回路の呼気側にHEPAフィルターを装着することが望ましい。

9. ネーザルハイフロー使用時の感染対策

第4章で記述されているように、患者に対して、ネーザルハイフローやリザーバーマスクなどを使用することがある。日本呼吸器学会からは、「実臨床において、機器や施設の酸素供給量に問題がなく、陰圧室が使用可能でPPE装着下であれば、ネーザルハイフローがリザーバーマスクよりも優先される」との指針がでている。本療法ではエアロゾルが発生するため、実施する場合には以下への注意が必要である（「4 重症度分類とマネジメント：中等症II」も参照）。

- ・原則として陰圧個室で使用する
- ・医療者はN95マスクを含めたPPE装着を順守すること
- ・カニュラの装着部を鼻腔内に正確に設置すること
- ・カニュラの上からサージカルマスクを装着すること（少なくとも医療従事者の入室前および入室中は必須）
- ・ガス流量は30～40 L/分で開始し、不足時に増量を検討すること
- ・水抜きが必要な場合は、水分の飛沫に注意すること

【参考】感染予防策を実施する期間*¹

患者（発症者）	
人工呼吸器などを要した患者	
無症状病原体保有者	

- *1 転院時にも本期間を考慮する
- *2 無症状病原体保有者の場合は、検体採取日から10日間
- *3 無症状病原体保有者の場合は、検体採取日から6日間
- *4 発症日から20日間経過までは、退院後も適切な感染予防策を講じること
- *5 症状とはCOVID-19による症状を指す。人工呼吸器関連肺炎（VAP）や続発した肺炎や合併症ならびに併存症などによる症状は除く。ただし、個々の症例の感染性については検査などによる定量的評価は困難であり、文献等を参考に主治医の判断が求められる（参考1）。

〈参考〉

- ・国立感染症研究所。発症からの感染可能期間と再陽性症例における感染性・二次感染リスクに関するエビデンスのまとめ。2021.2.18.
- ・厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」（2022.1.5, 2022.2.2.一部改正）

◆引用・参考文献◆

- ・国立感染症研究所ほか. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針 第 5.1 版. 2022.3.17.
- ・国立感染症研究所ほか. 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理. 2021.8.6 改訂版.
- ・日本環境感染学会. 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第 4 版）. 2021.11.22.
- ・日本呼吸器学会呼吸管理学術部会 . 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」記載の呼吸管理に関する事項について. 2021.3.7.
- ・日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会, 日本産婦人科感染症学会. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応（第 6 版）. 2021.12.20.
- ・日本周産期・新生児医学会. SARS-CoV-2 感染が証明されるか疑われる母体からの分娩での新生児蘇生に係る指針（第 2 版）. 2020.6.11.
- ・日本小児科学会. 新型コロナウイルス感染症に関する Q&A について. 2020.8.27.
- ・日本新生児成育医学会. 新型コロナウイルス感染症に対する出生後早期の新生児への対応について, 第 5 版. 2021.12.8.
- ・ACOG. Coronavirus (COVID-19), Pregnancy, and breastfeeding: A message for patients. January 26, 2022.
- ・Anoop SVS, et al. Effect of Vaccination on transmission of SARS-CoV-2. N Engl J Med 2021.
- ・CDC. Considerations for inpatient obstetric healthcare settings. 19 Nov 2021.
- ・Heather MS, et al. Monitoring incidence of COVID-19 cases, hospitalizations, and deaths, by vaccination status—Apr 4 –July 17, 2021. Morb Mortal Wkly Rep 2021.
- ・RCOG. Coronavirus (COVID-19), pregnancy and women’s health. 1 Jan 2022.

7

退院基準・解除基準

臨床症状による基準と病原体検査による基準があり、いずれかを満たせばよい。

1. 退院基準

臨床症状による基準と病原体検査による基準があり、いずれかを満たせばよい。


	臨床症状による基準	病原体検査による基準
有症状者* ¹		
無症状病原体保有者		
人工呼吸器等による治療を行った患者		

- * 1：人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
- * 2：症状が出始めた日とし、発症日が明らかではない場合には、陽性確定に係る検体採取日とする。
- * 3：解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう。
- * 4：その他の核酸増幅法を含む。
- * 5：陽性確定に係る検体採取日とする。

【参考】 期間計算のイメージ図

【有症状の場合】 *人工呼吸器等による治療を行わなかった場合【注1】

① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能



② 症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあげ、2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能




【無症状病原体保有者の場合】【注1】【注2】

① 検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から10日間経過した場合、退院可能



② 検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあげ2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能



【注1】上記の【有症状の場合】①と【無症状病原体保有者の場合】①のイメージ図は、発症時刻（無症状病原体保有者の場合は検体採取時刻）が同定可能であり、240時間（10日間）の経過観察を行った場合を想定している（その時点で退院基準・療養解除基準を満たす）。

【注2】B.1.1.529系統（オミクロン株）の無症状患者の療養解除基準については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。また、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用することなどの感染対策を求めること。詳細は厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について（2022.1.5 発出、2022.2.2 一部改正）」を参照すること。

【参考】早期退院の目安

医師の判断により退院基準を満たす以前でも、転院のみならず自宅療養・宿泊療養に移行し、必要に応じて適切な健康管理を行っていくことで対応することは可能である。オミクロン株による感染が想定される患者では、目安として「入院日を 0 日目として、4 日目以降の時点で中等症Ⅱ以上の悪化を認めない患者」の医療機関から宿泊療養・自宅療養への療養場所の変更や転院が検討される。

なお、60 歳以上の患者については、入院から 4 日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者も一部存在したことから留意が必要である。また、B.1.617.2 系統（デルタ株）の場合、発症 10 日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者も存在したことから、入院症例については、L452R 変異株 PCR 検査およびゲノム解析を優先的に実施し、デルタ株と判明した場合には、本取扱いを行わないこと。


〈参考〉

- ・厚生労働省「オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について」（2022 年 1 月 12 日事務連絡）
- ・厚生労働省「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について」（2022 年 2 月 8 日事務連絡）

・発症から中等症Ⅱ以上への移行までの日数の比較

（デルタ株中心：2021 年 7 月 1 日～10 月 31 日）


（オミクロン株：2021 年 12 月 22 日～2022 年 1 月 29 日）



・ 出典：広島県健康福祉局 第 70 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード資料 .2022.2.2)

・酸素投与に至る期間について（2022 年 1 月 5 日～1 月 28 日入院）

国立病院機構の診療データベース (NCDA) (全国 67 病院) によると、全入院患者 (n=1321 人) の中で、入院から 4 日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者は 0.9 % (=12 人 / 1321 人) であった。



・ 出典：国立病院機構本部 第 70 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード資料 .2022.2.2 を元に厚生労働省において作成

2. 宿泊療養等の解除基準

上記の退院基準と同様。

3. 生活指導

- ・ 患者が円滑に社会復帰できるよう保健所や近隣の医療機関などと連携する。
- ・ 罹患後症状が疑われる場合には適切な医療機関を受診するよう勧める。詳細は『別冊：罹患後症状のマネジメント』を参照すること。
- ・ 3密（密閉、密集、密接）を避けるように指導する（3密は1つでもあれば感染のリスクとなるため、リスクを減らすこと）。
- ・ 咳嗽が長引く場合は、マスクの着用など、咳エチケットを指導する。
- ・ 感染後からワクチンの追加接種までの間隔は、暫定的に3カ月が一つの目安とされている。なお、感染から回復後、期間を空けずにワクチン接種を希望する方についての機会は引き続き提供されている。感染後のワクチン接種に対する厚労省の見解の詳細は下記のHP（厚生労働省 HP 新型コロナワクチン Q & A）を参照すること。

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html>

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0127.html>

◆引用・参考文献◆

- ・ Hall V, et al. Protection against SARS-CoV-2 after Covid-19 vaccination and previous infection. N Engl J Med 2022.
- ・ Hammerman A, et al. Effectiveness of the BNT162b2 vaccine after recovery from Covid-19. N Engl J Med 2022.



新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第8.0版(ダイジェスト)

1 病原体・疫学

- 病原体(p.5)・国内発生状況(p.6)・海外発生状況を更新(p.9)

2 臨床像

- 臨床像を更新(特にオミクロン株の知見・インフルエンザとの鑑別を更新)(p.10)
- 重症化リスク因子(p.12)・胸部画像所見(p.17)・合併症(p.18)・妊婦例の特徴(p.23)を更新
- 小児の重症度・小児における家庭内感染率について更新・小児における死亡例を追加(p.20-21)

3 症例定義・診断・届出

- 症例定義(p.26)・届出(p.30)を更新

4 重症度分類とマネジメント

- 序文・重症度分類・軽症・中等症Ⅱ・重症・ECMO・血液浄化療法・血栓症対策・図を更新(p.32-41)
- 高齢者における療養のあり方を追加(p.34)
- 医療提供体制と自宅療養についてを参考から追加(p.33)

5 薬物療法

- モルヌピラビル(p.49)・ソトロマブ(p.51)・カシリマブ/イムデビマブ(p.52)・禁忌(p.57)
 - ・日本国内で開発中の薬剤(p.58)を更新

6 院内感染対策

- 序文(p.60-61)・換気を環境整備に統合し更新(p.63)・患者寝具類の洗濯(p.63)
 - ・職員の健康管理(p.64)・妊婦および新生児への対応(p.66)を更新・基本情報の表を追加(p.67)

7 退院基準・解除基準

- 退院基準を更新(p.69)

※ 日本呼吸器内科学会、日本集中治療医学会、日本感染症学会、日本小児科学会、日本産婦人科学会の支援を受けて、厚生労働行政推進調査事業費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業で作成