

令和4年10月5日

関係機関 各位

那霸市医師会

会長 友利博朗  
理事 宮城政剛

## 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の適正使用について

平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。

沖縄県医師会より「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の適正使用について」の通知が届きましたのでご案内申し上げます。

別紙は当会ホームページにも掲載致しますので、お手数ですがダウンロードをお願いします。

☆ 問合せ先 (那霸市医師会 事務局: 石垣・前泊 / 電話 098-868-7579)

記

沖医発第976号

令和4年10月4日

地区医師会担当理事 殿

沖縄県医師会

理事 砂川博司

## 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の適正使用について

今般、日本医師会より、標記文書が発出されましたのでお知らせ致します。

本件は、新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の適正使用についての通知となっております。

ラグブリオカプセルの薬価収載に伴う取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)」(令和4年9月28日付、沖医発第941号)等において、9月16日以降における、国が購入した本剤(国購入品)及び薬価収載品(一般流通品)としての本剤の取扱い等についてお知らせしたところです。

製造販売業者より、日本医師会に対し、本剤の適正使用に関する周知依頼があり、改めて、本剤を処方される先生方におかれましては、「ラグブリオ通知」並びに下記の点についてご留意いただきたくお知らせ致します。

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、貴管下会員への周知方につきご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記

## ● 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラグブリオカプセル)の適正使用について

(令和4年9月28日 (日医発第1263号) (技術))

※関係文書は文書管理システムへ掲載致します。

沖縄県医師会事務局業務2課: 赤嶺

TEL: 098-888-0087 FAX: 098-888-0089

g2@okinawa.med.or.jp

日医発第 1263 号 (技術)  
令和 4 年 9 月 28 日

都道府県医師会 担当理事 殿

公益社団法人日本医師会常任理事  
宮川 政昭  
(公印省略)

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラグブリオカプセル）の適正使用について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

ラグブリオカプセルの薬価収載に伴う取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラグブリオカプセル）の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について（その 3）」（令和 4 年 9 月 20 日付け日医発第 1207 号（健 II）（技術）（保険）にて貴会宛てに送付済み、以下「ラグブリオ通知」という）等において、9 月 16 日以降における、国が購入した本剤（国購入品）及び薬価収載品（一般流通品）としての本剤の取扱い等についてお知らせしたところです。

今般、製造販売業者より本会に対し、本剤の適正使用に関する周知依頼がありました。改めて、本剤を処方される先生方におかれでは、「ラグブリオ通知」並びに下記の点についてご留意いただきくお知らせいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記

- ラグブリオカプセルは、令和 3 年 12 月 21 日に特例承認され、承認条件（本剤添付文書「21. 承認条件」）が付されています。そのため、本剤添付文書に「承認時において有効性、安全性、品質に係る情報は限られており、引き続き情報を収集中である。そのため、本剤の使用に当たっては、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨並びに有効性及び安全性に関する情報を十分に説明し、文書による同意を得てから投与すること。」と記載されています。
- 今後、有効性、安全性及び品質に係る情報が集積され、同意等に関する本剤添付文書の改訂があった場合は、改めてお知らせします。

以上

貯法：室温保存  
\*\*有効期間：30箇月

抗ウイルス剤

モルヌピラビルカプセル

ラゲブリオ® カプセル200mg

LAGEVRIO® Capsules 200mg

本剤は、本邦で特例承認されたものであり、承認時において有効性、安全性、品質に係る情報は限られており、引き続き情報を収集中である。そのため、本剤の使用に当たっては、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨並びに有効性及び安全性に関する情報を十分に説明し、文書による同意を得てから投与すること。

劇薬

処方箋医薬品：注意一医師等の処方箋により使用すること



2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者  
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ラゲブリオ® カプセル200mg
有効成分	モルヌピラビル
分量	モルヌピラビルとして200mg
添加剤	内容物：ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム カプセル：ヒプロメロース、三二酸化鉄、酸化チタン

3.2 製剤の性状

販売名	ラゲブリオ® カプセル200mg
剤形・色調	硬カプセル剤 赤茶色不透明
識別コード	なし
形状	
号数	0
長径 (mm)	21.7
短径 (mm)	7.64
カプセル内容物 の質量 (mg)	285.7

4. 効能又は効果

SARS-CoV-2による感染症

5. 効能又は効果に関する注意

- 5.1 臨床試験における主な投与経験を踏まえ、SARS-CoV-2による感染症の重症化リスク因子を有する等、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。また、本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。[17.1.1 参照]  
5.2 重症度の高いSARS-CoV-2による感染症患者に対する有効性は確立していない。

6. 用法及び用量

通常、18歳以上の患者には、モルヌピラビルとして1回800mgを1日2回、5日間経口投与する。

7. 用法及び用量に関する注意

SARS-CoV-2による感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。臨床試験において、症状発現から6日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られない。[17.1.1 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.4 生殖能を有する者

妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び最終投与後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。[2.2、9.5 参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験で胎児毒性が報告されている。妊娠ラットの器官形成期にモルヌピラビルを投与した実験において、N-ヒドロキシシチシン (NHC) の臨床曝露量の8倍に相当する用量で確奇形及び胚・胎児致死が、3倍以上に相当する用量で胎児の発育遅延が認められている。また、妊娠ウサギの器官形成期にモルヌピラビルを投与した実験において、NHCの臨床曝露量の18倍に相当する用量で胎児体重の低値が認められている。[2.2、9.4 参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。  
動物において、モルヌピラビルの乳汁移行試験は実施しておらず、ヒト乳汁中の移行の有無及び乳汁産生への影響に関するデータはない。

9.7 小児等

18歳未満を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

\*11.1 重大な副作用

アナフィラキシー（頻度不明）

\*11.2 その他の副作用

	1%以上5%未満	1%未満	頻度不明
胃腸障害	下痢、恶心	嘔吐	
神経系障害	浮動性めまい、頭痛		
*皮膚及び皮下組織障害		発疹、蕁麻疹	中毒性皮疹、紅斑
*過敏症			血管性浮腫

15. その他の注意

15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 モルヌピラビル及びNHCの細菌を用いた変異原性試験の結果は陽性であった。しかし、げっ歯類を用いた2種の変異原性試験（Pig-a試験及びBig Blue®トランスクレジエンシク動物を用いたcJL遺伝子座における試験）を実施した結果、変異原性は認められなかった。In vitro小核試験及びラットを用いた小核試験の結果は陰性であった。

15.2.2 3ヶ月間投与毒性試験において、NHCのAUCに基づく臨床曝露量の5.4倍に相当する用量の投与で急速に成長しているラットの大腿骨及び腰骨に骨端軟骨成長板の肥厚が認められた。同様の変化は、ラットの1ヶ月間投与試験（曝露量は上記試験と同程度）並びにマウス（臨床曝露量の19倍までを1ヶ月間投与）及びイヌ（臨床曝露量の1.6倍までを14日間投与）の試験では認められていない。

15.2.3 イヌにNHCの臨床曝露量の0.4倍以上に相当する用量を投与した際に回復性のある骨髓毒性（すべての造血系細胞に影響）が認められた。モルヌピラビルを7日間投与した際に循環血の血球系細胞数及び血小板数に軽度の減少がみられ、14日間の投与で循環血により重度の変化がみられた。同様の変化は他の動物種では認められていない。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 健康成人

モルヌピラビルはNHCのプロドラッグであり、全身循環へ到達する前に主要代謝物であるNHCへ加水分解され細胞内に取り込まれた後、活性型であるリボヌクレオシド三リン酸化体（NHC-TP）にリン酸化される。

#### (1) 単回投与

健康成人にモルヌピラビル800mgを単回経口投与した際のNHCの血漿中濃度推移を図1に、血漿中薬物動態パラメータを表1に示す。モルヌピラビル50～1600mgの範囲で、NHCのC<sub>max</sub>及びAUCは概して用量に比例して増加した（外国人データ）。

図1 健康成人にモルヌピラビル800mgを単回経口投与した際のNHCの血漿中濃度推移（平均値±標準偏差）




表1 健康成人にモルヌピラビル800mgを単回経口投与した際のNHCの血漿中薬物動態パラメータ

例数	T <sub>max</sub> <sup>†</sup> (hr)	C <sub>max</sub> <sup>‡</sup> (ng/mL)	AUC <sub>0-12hr</sub> <sup>§</sup> (ng · hr/mL)
6	1.75 (1.50-2.50)	2770 (13.3)	8190 (21.5)

†中央値（範囲）

‡幾何平均（変動係数%）

#### (2) 反復投与

健康成人にモルヌピラビル800mgを12時間ごとに反復経口投与した際のNHCの血漿中薬物動態パラメータは表2のとおりであった。1日2回の反復経口投与で得られたNHCのAUC<sub>0-12hr</sub>の累積係数（1.09）に基づく有効半減期は3.3時間であった（外国人データ）。

表2 健康成人にモルヌピラビル800mgを12時間ごとに反復経口投与した際の定常状態におけるNHCの血漿中薬物動態パラメータ

例数	T <sub>max</sub> <sup>†</sup> (hr)	C <sub>max</sub> <sup>‡</sup> (ng/mL)	AUC <sub>0-12hr</sub> <sup>§</sup> (ng · hr/mL)
5	1.50 (1.00-2.02)	2970 (16.8)	8330 (17.9)

†中央値（範囲）

‡幾何平均（変動係数%）

### 16.2 吸収

#### 16.2.1 食事の影響

健康成人にモルヌピラビル200mgを単回経口投与<sup>①</sup>した際、高脂肪食摂取後投与では空腹時投与に比べてNHCのC<sub>max</sub>は35%減少し、AUCは両条件下で同程度であった（外国人データ）。本剤は、食事とは関係なく投与可能である。

### 16.3 分布

NHCのヒト血漿蛋白に対する結合率は0%であった（in vitroデータ）。

### 16.4 代謝

モルヌピラビルはNHCのプロドラッグであり、全身循環へ到達する前に主要代謝物であるNHCへ加水分解される。NHCは内因性ビリミンの代謝と同じ経路でウリジン及びシチジンへ代謝され、消失する。

### 16.5 排泄

健康成人にモルヌピラビル800mgを1日2回5.5日間反復経口投与<sup>①</sup>した際、NHCの尿中排泄率は3%であった（外国人データ）。

### 16.6 特定の背景を有する患者

#### 16.6.1 腎機能障害者

モルヌピラビル及びNHCの主要な消失経路は腎排泄ではないため、腎機能障害がこれらの排泄に影響を及ぼす可能性は低い。母集団薬物動態解析の結果、軽度及び中等度の腎機能障害がNHCの薬物動態に及ぼす意味のある影響はみられなかった（外国人データ）。重度腎機能障害患者（eGFR 30mL/min/1.73m<sup>2</sup>未満）又は透析を必要とする患者におけるモルヌピラビル及びNHCの薬物動態の評価は実施していない。

### 16.6.2 肝機能障害者

肝機能障害者におけるモルヌピラビル及びNHCの薬物動態の評価は実施していない。非臨床試験の結果、NHCの主要な消失経路は肝代謝ではないと考えられた。また、モルヌピラビルは主に消化管及び肝臓でNHCへ代謝される一方、モルヌピラビルの加水分解に必要な代謝酵素は広範な組織に分布しているため、肝機能障害がモルヌピラビル及びNHCの曝露量に影響を及ぼす可能性は低い。

### 16.6.3 高齢者

母集団薬物動態解析の結果、高齢者におけるNHCの薬物動態は若年者と同様であった（外国人データ）。

### 16.7 薬物相互作用

#### 16.7.1 In vitro試験成績

モルヌピラビル及びNHCは主要な薬物代謝酵素及びトランスポーターの基質ではない。また、モルヌピラビル及びNHCは主要な薬物代謝酵素及びトランスポーターに対する阻害作用又は誘導作用を示さなかった。

#### 16.7.2 臨床における薬物相互作用試験

臨床における薬物相互作用試験は実施していない。

注）本剤の承認された用法及び用量は、1回800mgを1日2回5日間経口投与である。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 國際共同第II／Ⅲ相試験【MOVe-OUT (002)・試験】

18歳以上のSARS-CoV-2による感染症患者を対象に、モルヌピラビルの有効性、安全性等を評価することを目的として、プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験を実施した。主要評価項目は、無作為化29日目までの理由を問わないすべての入院又は死亡した被験者の割合とした。第Ⅲ相パートでは、モルヌピラビル800mgを1日2回（12時間ごと）5日間経口投与した。主要な解析である中間解析では775例が無作為割り付けされ、無作為化29日目までの追跡を完了した時点（日本人被験者は含まれなかつた）での主要評価項目の結果は、モルヌピラビル800mg群7.3%（28/385例）及びプラセボ群14.1%（53/377例）であり、割合の群間差は-6.8%（95%信頼区间：-11.3, -2.4）であった（表1）。なお、無作為割り付けされた1433例（日本人被験者8例を含む）全例における補足的な解析での主要評価項目の結果は、モルヌピラビル800mg群6.8%（48/709例）及びプラセボ群9.7%（68/699例）であり、割合の群間差は-3.0%（95%信頼区间：-5.9, -0.1）であった。内訳は、モルヌピラビル800mg群で入院48/709例（6.8%）、死亡1/709例（0.1%）であり、プラセボ群で入院67/699例（9.6%）、死亡9/699例（1.3%）、不明1/699例（0.1%）であった。

表1 中間解析の主要評価項目の結果（Modified Intent-To-Treat集団）

	モルヌピラビル800mg群 (385例) 例数 (%)	プラセボ群 (377例) 例数 (%)	割合の群間差 <sup>†</sup> (95%信頼区间)	P値 <sup>‡‡</sup>
無作為化29日目までの理由を問わないすべての入院又は死亡 <sup>§</sup>	28 (7.3%)	53 (14.1%)	-6.8 (-11.3, -2.4)	0.0012
入院	28 (7.3%)	52 (13.8%)		
死亡	0 (0%)	8 (2.1%)		
不明	0 (0%)	1 (0.3%)		

†SARS-CoV-2による感染症の症状発現から無作為割付け日までの期間（3日間以下／3日間超）を層別因子とした層別Miettinen and Nurminen法。試験全体の有意水準は片側2.5%で、中間解析による仮説検定の多重性の調整方法としてGamma family型（γ=1）の消費閑数を用いた（有意水準片側0.0092）。

‡片側P値。

§病院又は急性期治療施設（例、救急救命室）において24時間以上の急性期治療を行った場合と定義した。

||無作為化29日目の状況が不明な被験者は、有効性解析において、入院又は死亡としてカウントされた。

注：無作為化29日目までに死亡したすべての症例は、入院後の死亡であった。

なお、本試験の主な選択・除外基準は表2のとおりであった。

表2 第Ⅲ相パートの主な選択・除外基準

選択基準	<p>1. SARS-CoV-2陽性（無作為割付け前5日以内に採取した検体を用いたPCR検査等により確認）。</p> <p>2. SARS-CoV-2による感染症の症状<sup>a)</sup> 発現が無作為割付け前5日以内であり、かつ無作為化時点においてSARS-CoV-2による感染症に関連する症状<sup>b)</sup>が1つ以上認められる。</p> <p>3. 以下の定義における、軽症患者又は中等症患者。</p> <p>SARS-CoV-2による感染症の重症度の判定に用いられた定義は以下のとおり。</p> <p>【軽症】①及び②を満たす</p> <p>①次のすべてが認められる 呼吸数が20回／分未満、心拍数が90回／分未満、SpO<sub>2</sub>が93%超<sup>c)</sup>。</p> <p>②次のいずれも認められない 安静時又は労作時の息切れ、呼吸不全<sup>d)</sup>、ショック状態、多臓器機能不全</p> <p>【中等症】①～③をすべて満たす</p> <p>①次のうち、1つ以上が認められる 労作時の息切れ、呼吸数が20回／分以上30回／分未満、心拍数が90回／分以上125回／分未満</p> <p>②次のうち、いずれかが認められる ・SpO<sub>2</sub>が93%超<sup>c)</sup> ・SpO<sub>2</sub>に関わらず、SARS-CoV-2による感染症のために4L/min以下の酸素投与を要する</p> <p>③次のいずれも認められない 安静時の息切れ、呼吸不全<sup>d)</sup>、ショック状態、多臓器機能不全</p> <p>4. 次のSARS-CoV-2による感染症の重症化リスク因子を1つ以上有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・61歳以上</li> <li>・活動性のがん（免疫抑制又は高い死亡率を伴わないがんは除く）</li> <li>・慢性腎臓病</li> <li>・慢性閉塞性肺疾患</li> <li>・肥満（BMI 30kg/m<sup>2</sup>以上）</li> <li>・重篤な心疾患（心不全、冠動脈疾患又は心筋梗塞）</li> <li>・糖尿病</li> </ul>
除外基準	<p>1. 入院中又は無作為割付け後48時間以内にSARS-CoV-2による感染症のために入院が必要となることが予想される。</p> <p>2. SARS-CoV-2による感染症に対するワクチンを無作為割付け前に接種した、又は無作為化29日目までに接種を予定している。</p> <p>3. 本試験への組入れ理由となった今回のSARS-CoV-2による感染症に対するモノクローナル抗体による治療歴を有する。</p>

- a) 具体的な症状の規定なし
- b) 咳、咽頭痛、鼻閉、鼻水、労作時の息切れ又は呼吸困難、筋肉又は体の痛み、疲労、発熱（38.0°C超）、悪寒、頭痛、恶心、嘔吐、下痢、嗅覚消失、味覚消失
- c) 室内気又はSARS-CoV-2による感染症以外の理由で酸素投与されておりSARS-CoV-2による感染症の症状発現以降に酸素量が増量されていない状態における数値
- d) 次の①～④を1つ以上要する場合：①気管内挿管及び人工呼吸器、②鼻カニューレを用いた高流量酸素療法（流量20L/min超、酸素割合0.5以上）、③非侵襲的陽圧換気、④ECMO
- 副作用発現頻度は、モルヌピラビル800mg群で12.4%（48/386例）であり、主な副作用（発現割合1%以上）は、下拘3.1%（12/386例）、恶心2.3%（9/386例）、浮動性めまい1.3%（5/386例）、頭痛1.0%（4/386例）であった。[5.1.7. 参照]

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

モルヌピラビルはプロドラッグであり、NHCに代謝され細胞内に取り込まれた後、活性型であるNHC-TPにリン酸化される。NHC-TPがウイルス由来RNA依存性RNAポリメラーゼによりウイルスRNAに取り込まれた結果、ウイルスゲノムのエラー頻度が増加し、ウイルスの増殖が阻害される<sup>1), 2)</sup>。

### 18.2 In vitro抗ウイルス作用

NHCはVero E6細胞を用いた細胞培養系でSARS-CoV-2 (USA-WA1/2020株)に対して抗ウイルス作用を示し、50%有効濃度(EC<sub>50</sub>値)は0.78～2.03 μmol/Lであった。NHCはSARS-CoV-2の従来株 (USA-WA1/2020株)、並びに変異株であるalpha株 (B.1.1.7系統)、beta株 (B.1.351系統)、gamma株 (P.1系統) 及びdelta株 (B.1.617.2系統)に対して同程度の抗ウイルス作用を示し、EC<sub>50</sub>値はそれぞれ1.41、1.59、1.77、1.32及び1.68 μmol/Lであった。また、NHCはSARS-CoV-2の従来株 (USA-WA1/2020株)、並びに変異株であるomicron株 (B.1.1.529系統)のBA.1系統及びBA.1.1系統に対して同程度の抗ウイルス作用を示し、EC<sub>50</sub>の平均値はそれぞれ0.87、1.09及び2.61 μmol/Lであった。

### 18.3 In vivo抗ウイルス作用

SARS-CoV-2感染マウス、ハムスター及びフェレットモデルを用いてモルヌピラビルの抗ウイルス作用を確認した。マウスでは、モルヌピラビルはウイルスを接種した移植ヒト肺組織でのSARS-CoV-2の感染性ウイルス量を減少させた。SARS-CoV-2感染フェレットモデルでは、モルヌピラビルは上気道でのSARS-CoV-2の感染性ウイルス量を減少させ、同居させたウイルス非接種薬物非投与動物での感染性ウイルス量（感染フェレットから隔離後4日目）は検出限界未満であった。SARS-CoV-2感染シリアルハムスターモデルでは、モルヌピラビルは肺でのウイルスRNA及び感染性ウイルス量を減少させた。感染後に摘出した肺組織の病理組織学的検査で、裸眼群と比較してモルヌピラビル群ではSARS-CoV-2のウイルス抗原量の低下及び肺病変の軽減が認められた。

### 18.4 薬剤耐性

細胞培養系でのSARS-CoV-2のNHCに対する耐性の誘導について検討していない。他のコロナウイルス (MERS-CoV) を用いた耐性誘導試験では、細胞培養系で30回継代した結果、2倍程度の感受性の低下が認められた。この30回継代したMERS-CoVではゲノム全体にランダムに変異が認められた。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：モルヌピラビル (Molnupiravir)


化 学 名：[(2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-[(4Z)-4-(hydroxylimino)-2-oxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]oxolan-2-yl]methyl 2-methylpropanoate

分 子 式：C<sub>14</sub>H<sub>19</sub>N<sub>3</sub>O<sub>7</sub>

分 子 量：329.31

性 状：白色の粉末で、メタノールに溶けやすく、水にやや溶けやすく、酢酸エチルに溶けにくい。

化学構造式：



## 21. 承認条件

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

21.2 本剤の投与が適切と判断される症例のみを対象に、あらかじめ患者又は代語者に有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、文書による同意を得てから初めて投与されるよう、医師に対して要請すること。

21.3 医薬品医療機器等法施行規則第41条に基づく資料の提出の猶予期間は、承認取得から起算して6ヶ月とする。また、提出された資料等により、承認事項を変更する必要が認められた場合には、医薬品医療機器等法第74条の第2項に基づき承認事項の変更を命ずることがあること。

## 22. 包装

40カプセル [瓶、パラ]。

## 23. 主要文献

1) Crotty S, et al. Nat Med. 2009; 6: 1375-9.

2) Tejero H, et al. Curr Top Microbiol Immunol. 2016; 392: 161-79.

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

MSD株式会社 MSDカスタマーサポートセンター

東京都千代田区九段北1-13-12

医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

**M S D 株式会社**

東京都千代田区九段北1-13-12

### 26.2 プロモーション提携

**杏林製薬株式会社**

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地